

Previsão agrometeorológica para o final de outubro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2019 *Брой:* 10/2019



Na maioria dos dias do período vindouro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo seco e quente para a estação, o que levará a um aprofundamento do déficit de humidade nas culturas de outono. Na maior parte do país, especialmente em locais do Noroeste da Bulgária – as estações agrometeorológicas de Kneja e Băzovec, na Planície de Sófia – a estação agrometeorológica de Lozen, e na Planície da Trácia Superior – as estações agrometeorológicas de Plovdiv, Pazardzhik e Sliven, as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm são escassas, abaixo de 45–50% da capacidade de campo, e em alguns locais completamente esgotadas. Nestas áreas, o déficit de humidade irá restringir e atrasar o desenvolvimento do trigo, cevada e colza de inverno.

As precipitações previstas para o final do período não terão significado económico. Em alguns locais da Planície Danubiana existe um risco real de dessecação de parte das culturas de cereais de inverno germinadas.

No contexto da seca intensificada, há exceções nas regiões extremas do sul e sudeste, onde durante a primeira década de outubro caíram quantidades de precipitação mais elevadas – mais de 25–30 l/m² – Sandanski, Kardzhali, Haskovo, Elhovo e Burgas. Estas melhoraram as condições para a sementeira e para o progresso das fases iniciais de vegetação das culturas de outono semeadas.

Durante o próximo período, nas regiões onde a humidade não é um fator limitante, será observada a emergência e o início da formação de folhas no trigo e na cevada. Parte das culturas nas regiões do sul, principalmente as semeadas no início de outubro, entrará na fase da terceira folha – a estação agrometeorológica de Karnobat.

Durante a última semana de outubro, as condições serão adequadas para a limpeza das áreas de culturas tardias em linha e para a colheita das variedades de outono-inverno de árvores de fruto. O período é adequado para o plantio de framboeseiras e groselheiras-pretas.

Fonte NIMH