

Período com condições adequadas para a sementeira pré-inverno de culturas hortícolas resistentes ao frio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.12.2019 Брой: 12/2019



Durante a segunda década de dezembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo ameno para a estação. Nas áreas de campo do país, são previstas temperaturas mínimas positivas, bem como valores médios diários em torno e acima do mínimo biológico necessário para a retomada dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno. Condições para vegetação atrasada no trigo e na cevada ocorrerão principalmente nas regiões sul e ao longo da costa do Mar Negro. No final da segunda década, o estágio de crescimento da terceira folha predominará nas culturas de cereais de inverno. As lavouras semeadas em novembro não estão bem estabelecidas e estão nos estágios de emergência e formação inicial

das folhas. O trigo no estágio de perfilhamento, que é um pré-requisito para a hibernação bem-sucedida, é encontrado em parte das regiões orientais (Glavinitsa, Silistra, Tsarev Brod, D. Chiflik, Karnobat) e em locais da Planície do Danúbio (Novachene).

Como resultado da prolongada seca outonal, as lavouras de trigo têm densidade irregular. Ela varia de 350 a 550–600 plantas por metro quadrado.

Na colza, apenas parte das lavouras formou uma roseta durante sua vegetação outonal, um estágio de crescimento no qual as plantas hibernam com sucesso.

Não há previsão de precipitação significativa durante o período, e em muitos locais das áreas de campo as condições permitirão a realização da aração profunda das áreas designadas para culturas de primavera. Nas regiões sul, o próximo período é adequado para realizar a semeadura pré-inverno de algumas culturas hortícolas tolerantes ao frio – ervilhas, favas, cenouras e outras.

Fonte: NIMH