

Previsão agrometeorológica para meados de janeiro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.01.2020 Брой: 1/2020



O tempo relativamente seco esperado durante o período será adequado para realizar aragens profundas e cultivos entre linhas em vinhas e pomares, que destroem uma grande parte dos estágios de hibernação de numerosas pragas (gorgulhos, mariposas, moscas-das-frutas, etc.). As temperaturas diurnas positivas previstas permitirão a implementação da pulverização de proteção de plantas de inverno em pomares.

No início de janeiro, em alguns locais do Oeste da Bulgária (Vidin, Knezha, Dragoman, Sófia, Kyustendil) e na Planície Trácia (Plovdiv, Chirpan), foram registradas temperaturas mínimas de cerca de menos 10-11°C. Esses valores, em condições sem cobertura de neve e com uma persistência mais prolongada, são perigosos para as

culturas de inverno semeadas tardiamente que estão hibernando nos estágios de emergência e desenvolvimento inicial das folhas.

Após o breve período de frio, durante o período seguinte as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança. São previstas temperaturas acima do normal até meados de janeiro, mas seus valores médios diários permanecerão abaixo do mínimo biológico necessário para a retomada dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno, e as plantações permanecerão em estado de dormência.

Não são previstas precipitações significativas durante o período, e o nível das reservas de umidade do solo nas culturas de cereais de inverno nas camadas de 50 e 100 cm permanecerá excepcionalmente baixo para a estação – em algumas regiões orientais abaixo de 60% da capacidade de campo. No início do inverno, em anos sem seca outonal, as reservas de umidade do solo na camada de 100 cm geralmente atingem níveis próximos à capacidade de campo.

O tempo relativamente seco esperado durante o período será adequado para realizar aragens profundas e cultivos entre linhas em vinhas e pomares, que destroem uma grande parte dos estágios de hibernação de numerosas pragas (gorgulhos, mariposas, moscas-das-frutas, etc.). As temperaturas diurnas positivas previstas permitirão a implementação da pulverização de proteção de plantas de inverno em pomares.

Fonte: NIMH