

Previsão agrometeorológica para o final de janeiro e o início de fevereiro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.02.2020 Брой: 2/2020



Durante o período, como resultado das temperaturas acima do normal, as culturas de outono nas áreas de campo passarão de uma dormência profunda para uma dormência relativa. Em locais da Planície do Danúbio e nas regiões orientais, onde são previstas temperaturas máximas de até 14-15°C, as temperaturas médias diárias atingirão e excederão o mínimo biológico necessário para a retomada dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno. Estas temperaturas acima do normal afetarão principalmente as lavouras menos desenvolvidas, nas fases de emergência e de 1-2 folhas. Uma parte significativa do trigo cessou sua vegetação outonal nos estágios de terceira folha e perfilhamento.

A precipitação esperada durante o próximo período não terá significado econômico e as reservas de humidade do solo para as culturas de outono nas áreas de campo permanecerão invulgarmente baixas para a época. No final da segunda década de janeiro, em algumas regiões orientais (Razgrad, Sliven), o nível das reservas de humidade nas camadas de 50 e 100 cm estava abaixo de 60% da capacidade de campo.

No início de fevereiro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo quente para a estação. Até meados da primeira década de fevereiro, são previstas temperaturas máximas de cerca de 18-20°C em muitas partes do país, e temperaturas médias diárias 4-5°C acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno. Sob estas altas temperaturas, invulgares para a época, numa grande parte das áreas de campo, o fator limitante para a retomada dos processos vegetativos nas culturas de outono será o déficit de humidade nas camadas superiores do solo, como resultado da escassa precipitação de janeiro, que, com poucas exceções, está abaixo de 10 l/m². Devido à falta de humidade, observa-se um amarelecimento parcial das lavouras de trigo em algumas áreas de campo.

No final da semana atual, espera-se uma mudança significativa nas condições agrometeorológicas. A previsão de uma queda acentuada das temperaturas dificultará o inchaço prematuro das gemas em algumas árvores frutíferas de floração precoce. É esperada precipitação de chuva e neve, bem como uma melhoria nas condições para a hibernação das culturas agrícolas.

Na maioria dos dias do período, as condições permitirão a realização da poda em vinhas e pomares. Nas culturas frutíferas, juntamente com a poda de desbaste e encurtamento, também é realizada a poda fitossanitária – são destruídos ramos e rebentos mumificados, secos e infestados por doenças. Ao realizar a poda fitossanitária, os cortes devem ser feitos a uma distância de 30-40 cm da área danificada, e as ferramentas devem ser desinfetadas após cada corte.

Fonte: NIMH