

Atividades difíceis de proteção de plantas em meados de março

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



No início de março, precipitações entre 20 – 40 l/m² caíram sobre o Oeste e o Centro da Bulgária, o que levou a um aumento das reservas de humidade do solo na camada de 50 cm e 100 cm nas culturas agrícolas.

Em meados de março, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas médias diárias em torno e acima do mínimo biológico das culturas agrícolas de inverno. Os seus processos de vegetação prosseguirão a ritmos normais. As precipitações previstas para a primeira metade do período, novamente mais significativas em quantidade no Sudoeste e Centro da Bulgária, favorecerão o aumento das reservas de humidade na camada de um metro do solo.

Durante o período, o trigo estará na fase de afilhamento em massa e será observado um aumento do coeficiente de afilhamento. Ocorrerá ramificação na colza. Nas espécies frutíferas, ocorrerá o inchaço e a rebentação das gemas, e em algumas fruteiras de caroço (pêssego, damasco) no Centro e Leste da Bulgária, também ocorrerá a fase de floração. Durante o período, inicia-se o período agrotécnico para a sementeira do girassol no Sul da Bulgária.

As precipitações previstas em muitos locais das áreas de campo dificultarão a realização de uma preparação de solo de qualidade e a implementação de atividades de proteção das plantas.

Fonte NIMH