

Aumento significativo das temperaturas no início de abril

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2020 *Брой:* 4/2020



Após os eventos climáticos incomuns do inverno no final de março e início de abril, que causaram danos adicionais às culturas frutíferas avançadas em seu desenvolvimento, durante o próximo período de sete dias as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança significativa.

Um aumento nas temperaturas está previsto para os primeiros dias do período. Nas áreas de campo, seus valores médios diários atingirão e ultrapassarão o mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno e da canola.

Uma normalização das condições de temperatura e uma ativação dos processos vegetativos nas lavouras de outono e nas culturas de primavera semeadas está prevista para o final do período. No final da primeira década de abril, os seguintes estágios serão observados no trigo e na cevada: perfilhamento, transição para o alongamento do caule e estágio de alongamento do caule, principalmente nas lavouras em partes da Planície do Danúbio e nas regiões orientais do país (estações agrometeorológicas: Novachene, Silistra, Tsarev Brod, Razgrad, D. Chiflik, Karnobat). Na canola de inverno, será observado o início do estágio de brotação.

Até o final da primeira década de abril, em muitos lugares das regiões de campo, o alto teor de umidade nas camadas superiores do solo, como resultado das precipitações significativas no início da primavera, dificultará a realização do preparo do solo pré-semeadura e a semeadura das culturas de primavera de médio a precoce. Por esse motivo, atrasos na semeadura do girassol são esperados. O prazo agrotécnico para a semeadura do girassol na Planície do Danúbio é até meados da primeira década de abril, e até o final da década – no Nordeste da Bulgária, nas áreas costeiras e nos campos altos do Sudoeste da Bulgária.

Condições favoráveis para a realização de pulverizações de proteção de plantas em culturas frutíferas não afetadas por geadas de primavera ocorrerão durante a segunda metade do período.

Fonte NIMH