

Besouro peludo – *Epicometis hirta*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2020 *Брой:* 4/2020



Descrição da praga

O besouro peludo é uma praga amplamente distribuída em culturas frutíferas na Bulgária. Ele destrói completamente as flores atacadas, roendo todos os órgãos florais (pétalas, estames, pistilo). Além disso, rói botões florais não abertos, brotos jovens e folhas novas. Entre as culturas frutíferas, ataca e danifica mais severamente a marmeleira, a pereira, a macieira e, com menos frequência, a ameixeira, a ginjeira, o pessegueiro e o morangueiro. Além destas, ataca frutas pequenas, videiras, culturas crucíferas, cereais, leguminosas, algumas plantas das famílias Chenopodiaceae e Apiaceae, etc.

Danos:

A praga desenvolve uma geração por ano e passa o inverno como inseto adulto no solo. Os besouros tornam-se ativos no início da primavera e causam danos durante a floração, atacando todas as espécies frutíferas em flor. Eles são ativos em clima ensolarado, enquanto em tempo frio e fresco se escondem sob torrões de terra ou permanecem imóveis nas plantas.

Em primaveras secas e quentes, os danos causados pelo besouro são significativos. Os adultos alimentam-se das flores, roendo os pistilos, estames e pétalas.

As flores ficam amarelas e parecem danificadas pela geada. O besouro também rói cavidades nos frutos jovens, especialmente na cerejeira, que ficam deformados.

Controle:

O besouro peludo aparece durante o período de floração das culturas frutíferas, e o uso de produtos fitossanitários é altamente restrito.

Em pequenas áreas, aplica-se a coleta manual nas horas da manhã e a destruição dos besouros, após sacudir os ramos ou as árvores inteiras.

As medidas de controle são implementadas em um limiar de dano econômico de 3–5 indivíduos/100 rosetas, ou 5% de inflorescências danificadas. O controle químico do besouro peludo é difícil, primeiro porque é realizado durante a floração e a maioria dos produtos fitossanitários é prejudicial às abelhas, e segundo porque a cobertura corporal do besouro oferece uma proteção muito boa contra pesticidas.

Inseticidas registrados para controle: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da (em colza).