

A marta pode causar danos graves aos frutos da cerejeira

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



A cetónia-dourada – *Cetonia aurata* L. está amplamente distribuída por todo o país. Danifica árvores frutíferas, com preferência pela cerejeira e pela pereira. Também é encontrada na videira, na roseira e na roseira-brava. Adicionalmente, foi verificada a causar danos no milho e na couve. Ocorre com mais frequência nas flores da roseira-brava e da roseira. Também se alimenta das partes florais da camomila, do coentro e da mil-folhas.

Nos últimos anos, a cetónia-dourada foi observada em algumas plantações de cerejeiras e jardins domésticos na região de Kyustendil. A sua densidade populacional é maior em áreas com infestantes e em arbustos de roseira-brava e pomares de cerejeira abandonados. Em árvores individuais foram registados até 80 – 100 besouros.

O inseto adulto é um besouro relativamente grande. O comprimento do corpo chega a 2 cm. O pronoto e os élitros são de um verde intenso com um brilho metálico dourado. A parte ventral é de cor vermelho-cobre. Existem listras transversais brancas nos élitros.

A cetónia-dourada tem uma geração por ano. Os besouros passam o inverno no solo. Na primavera, aparecem durante a floração das árvores frutíferas. Os besouros são ativos e voam ao meio-dia, quando está mais quente. Roem os estames e o pistilo das flores e danificam as folhas e os frutos.

Nos frutos de cerejeira infestados, eles roem feridas profundas e, na maioria dos casos, destroem-nos completamente. Registámos 80% de frutos danificados numa única árvore.

Danos

As fêmeas fertilizadas depositam os seus ovos em madeira podre e em solo rico em madeira decomposta. As larvas desenvolvem-se neste ambiente de decomposição e pupam no mesmo ano.

O controlo químico contra a cetónia-dourada deve ser dirigido ao estágio adulto, que causa os principais danos. Até agora, os inseticidas não foram testados contra esta praga porque ela não ocorria frequentemente. O controlo também é complicado pelo facto de a pulverização ter de ser realizada na época de maturação dos frutos e os períodos de carência terem de ser respeitados.

Controlo

A cetónia-dourada pertence à família dos escaravelhos, que também inclui o besouro-peludo. Recomenda-se a utilização de inseticidas com um curto intervalo de segurança, que sejam aprovados contra o besouro-peludo: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da. Também podem ser utilizadas armadilhas azul-claras ou brancas com atrativo. Para reduzir os danos causados pela cetónia-dourada, também é necessária uma boa prática agronómica – lavoura regular, fertilização, recolha, remoção e destruição da vegetação infestante, arbustos de roseira-brava e resíduos vegetais em decomposição, onde as larvas da praga se desenvolvem.