

Chuvas e aumento do risco de granizo no início de maio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 *Брой:* 5/2020



Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e temperaturas médias diárias próximas das normas climáticas para a primeira década de maio. Precipitação generalizada está prevista durante o período, juntamente com uma melhoria nas condições para a vegetação das culturas de outono-inverno e das culturas de primavera já semeadas. Após a seca de primavera intensificada nas regiões nordestinas, a precipitação esperada proporcionará uma oportunidade para a recuperação de parte das culturas de cereais de inverno que se encontram em estado crítico. O déficit de humidade do solo em muitos locais do Nordeste da Bulgária tem sido um fator limitante para o desenvolvimento do trigo e uma causa do amarelecimento em parte das searas.

Nas regiões sudoeste e na maior parte da Planície Trácia, onde caiu precipitação de significado económico em abril – em alguns locais mais de 50-60 l/m² (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83 l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Chirpan-67 l/m²), o estado das culturas de cereais de inverno é bom.

Durante o próximo período, nas áreas de campo, o trigo e a cevada passarão por uma transição do alongamento do caule para o emborrachamento e a fase de espigamento. Para o milho e o girassol, dependendo das datas de sementeira, serão observadas as fases de emergência e formação de folhas.

Durante a primeira semana de maio, não são previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas agrícolas, mas a probabilidade de granizo permanece elevada. Em caso de danos por granizo, recomenda-se que as culturas afetadas sejam tratadas na primeira oportunidade com fungicidas à base de cobre para reduzir o risco de infeções secundárias.

Fonte: NIMH