

Previsão agrometeorológica para o mês de maio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 17.05.2020 *Брой:* 5/2020



Durante a primeira década de maio, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo moderado, com temperaturas médias diárias próximas das normas climáticas. No início de maio, a precipitação esperada será decisiva para a sobrevivência de parte das culturas de cereais de inverno no nordeste da Bulgária. No final de abril, em muitos locais das regiões nordestinas, o nível das reservas de humidade do solo para o trigo nas camadas de 50 cm e 100 cm estava invulgarmente baixo para a época, abaixo de 55-60% da capacidade de campo, como resultado de precipitação abaixo do normal durante a primeira metade da primavera. Por esta razão, parte dos povoamentos de trigo estão em estado crítico. Danos e amarelecimento da massa foliar (até 50-60%), como consequência do défice de humidade do solo, foram registados no trigo nas estações agrometeorológicas de Silistra e Tsarev Brod.

Durante a primeira década de maio, a fase de espigamento será observada no trigo e na cevada nas regiões de campo.

No final da primeira e durante a segunda década, prevê-se um aumento das temperaturas e aceleração da vegetação nas culturas de cereais de inverno e nas culturas de primavera semeadas. Durante este período, ocorrerá a floração, fertilização e formação do grão no trigo.

Durante a terceira década, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e fresco para o período. A precipitação significativa esperada terá uma importância excepcionalmente grande para as culturas de cereais de inverno, nas quais o enchimento do grão estará em curso. No final de maio, parte dos povoamentos de cevada e trigo em locais das regiões sul entrarão na fase de maturação leitosa.

Durante o mês, ocorrerá a formação foliar no milho e no girassol. No final da terceira década, no girassol semeado dentro do prazo agrotécnico, será observada a formação da inflorescência.

Nas culturas frutícolas, ocorrerá a formação e o alargamento do vingamento dos frutos. Na videira, será observada a separação da inflorescência e, no final do mês, a fase de floração também.

A precipitação frequente em maio criará condições favoráveis para o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas: míldios na videira e em culturas hortícolas; sarna em espécies de frutos pomóideos, podridão castanha precoce e cribramento em árvores de fruto de caroço; ferrugens (amarela, castanha) e fusariose da espiga em culturas de cereais de inverno.

Condições mais adequadas para a realização de pulverizações de proteção das plantas ocorrerão durante a segunda metade da primeira e na maioria dos dias da segunda década.

Em maio, não são previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas agrícolas, mas a probabilidade de granizo permanece elevada. Em caso de danos por granizo, é aconselhável que as culturas afetadas sejam tratadas na primeira oportunidade com fungicidas contendo cobre para uma cicatrização mais rápida das feridas e para reduzir o risco de infeções secundárias.