

21 de maio de 2024

Tempo instável e frio para a época

Uma massa de ar frio e instável está a afetar a região, trazendo condições meteorológicas atípicas para esta altura do ano.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.05.2020 *Брой:* 5/2020



No final de maio e início de junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo instável e frio para a estação. Está prevista precipitação significativa em muitas partes do país, melhorando as reservas de humidade nas camadas superiores do solo e as condições para a vegetação das culturas de primavera. A precipitação esperada no final de maio e início de junho revelar-se-á demasiado tardia para parte das searas de trigo em algumas áreas da Bulgária Oriental (Provadia, Shabla, D. Chiflik, Karnobat), onde as fases de espigamento, floração, fertilização e formação do grão ocorreram sob um défice de humidade do solo em

aprofundamento. Em algumas regiões orientais, as searas de trigo prematuramente amarelecidas, com espigas mal granadas, não serão colhidas.

Durante o período seguinte, nos campos altos, as culturas cerealíferas de inverno estarão na fase de enchimento do grão. Nas regiões de planície, o trigo estará na fase de maturação leitosa. A cevada estará na fase de maturação leitosa e, no final do período, começará a transição para a maturação cerosa. A colza estará na fase de maturação. Durante o período, o milho e o girassol estarão na fase de formação das folhas. No girassol semeado dentro do prazo agrotécnico, será observada a formação da inflorescência.

O tempo frio previsto com precipitação frequente durante o período criará condições para um aumento da pressão de infecção por alguns agentes patogénicos fúngicos – míldio em vinhas e culturas hortícolas, podridão parda tardia em cultivares tardias de cerejeira, sarna em espécies de frutos pomáceos, etc. No início de junho, o controlo de uma das pragas mais perigosas em pomares – a traça-das-maçãs – não deve ser subestimado. As condições para realizar pulverizações de proteção das plantas estarão presentes em meados da primeira década de junho.

Fonte: NIMH