

Previsão agrometeorológica para o mês de junho

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



Durante a maioria dos dias da primeira e segunda décadas de junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável. No início do mês, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá em um ritmo mais lento, sob temperaturas abaixo do normal. Até meados da primeira década, são previstas precipitações em muitas partes do país, melhorando as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm e as condições para a vegetação das culturas de primavera. As chuvas do final de maio e as chuvas esperadas para o início de junho revelaram-se demasiado tardias para as culturas de outono-semeadura em muitos locais do leste da Bulgária, onde as fases reprodutivas do seu desenvolvimento ocorreram sob um défice crescente de humidade do solo. Em grande parte das regiões orientais, são previstos rendimentos severamente reduzidos e, em alguns locais, as culturas prematuramente amareladas, com espigas mal granadas, não serão colhidas.

Após o tempo mais frio do que o habitual para a estação durante a segunda metade da primeira década, prevê-se uma melhoria nas condições térmicas. Durante a década, nas culturas de cereais de inverno nos campos altos, ocorrerá o enchimento do grão. Nas áreas de planície, o trigo estará na fase de maturação leitosa e, até ao final da década, em alguns locais, também será observado o início da fase de maturação cerosa. *Durante o período interfásico, do enchimento do grão à maturação leitosa, as larvas do percevejo-do-trigo causam sérios danos ao trigo. Durante este período, as culturas de trigo devem ser monitorizadas quanto à presença da praga e, se a sua densidade exceder o limiar económico de danos, é necessário um tratamento atempado.*

No início da segunda década, nas áreas de planície, a cevada estará predominantemente na fase de maturação cerosa e a colza estará na fase de maturação.

Durante a segunda metade de junho, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo mais acelerado. No final da segunda e início da terceira década, o trigo estará predominantemente na fase de maturação.

Até ao final de junho, algumas das culturas de primavera entrarão nas fases reprodutivas do seu desenvolvimento: no girassol, será observado o início da floração e, nos híbridos de milho mais precoces – o emborrachamento e a floração da espiga.

O tempo instável previsto para junho, com precipitações frequentes, criará condições para o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas: míldios em vinhas e culturas hortícolas, sarna em árvores de fruto, etc. Durante o mês, a probabilidade de ocorrência de granizo permanecerá elevada. Após uma tempestade de granizo, as culturas frutícolas e hortícolas afetadas devem ser tratadas com fungicidas à base de cobre na primeira oportunidade.

Fonte: NIMH