

Período com condições para aumento do fundo infeccioso de doenças fúngicas em culturas agrícolas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.07.2020 Брой: 7/2020



No final de junho e início de julho, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança significativa. Durante os últimos dias de junho, não está prevista precipitação nas áreas de campo, o que proporcionará uma oportunidade para realizar alguns tratamentos fitossanitários urgentes. O tempo instável persistente no período anterior criou condições para um aumento do fundo infeccioso de uma série de doenças fúngicas: sarna, mancha bacteriana e podridão parda tardia em árvores frutíferas; míldio em vinhas e culturas hortícolas, etc. Em muitas partes do país, a precipitação significativa impediu a colheita da safra de grãos maduros. Em alguns dos povoamentos de trigo alagados, começou o escurecimento das espigas, o que representa um risco de deterioração da qualidade dos grãos.

Durante o período seguinte, o desenvolvimento das culturas de primavera prosseguirá em um ritmo acelerado, com temperaturas próximas e acima das normas climáticas para o início do verão e com reservas de umidade boas a muito boas nas camadas superiores do solo. Na maior parte do país, com exceção das regiões extremo noroeste (estação agrometeorológica de Buzovets) e sudoeste (estação agrometeorológica de Sandanski), as reservas de umidade do solo na camada de 50 cm estão em níveis superiores a 75–80% da capacidade de campo. Durante o período, o girassol estará nas fases de formação da inflorescência e floração, principalmente nos povoamentos das regiões sul. Nos híbridos precoces de milho, serão observados os estágios de emborrachamento e floração do pendão, enquanto nos híbridos mais tardios – formação de folhas. No final de junho e início de julho, os campos de milho devem ser inspecionados quanto à presença de uma das pragas mais importantes – a broca-europeia-do-milho, e quando sua densidade exceder o nível de dano econômico (10 massas de ovos por 100 plantas), o tratamento é necessário (contra as larvas jovens antes que elas penetrem nos colmos).

No início de julho, está prevista precipitação novamente e as condições para realizar a atividade mais importante – a colheita do trigo – se deteriorarão.

Fonte: NIMH