

Previsão agrometeorológica para julho

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 *Брой:* 7/2020



Durante a primeira metade da primeira década de julho, o desenvolvimento das culturas agrícolas ocorrerá sob condições térmicas acima do normal. No início do mês, na maior parte do país, com exceção das regiões extremo noroeste (estação agrometeorológica de Buzovets) e sudoeste (estação agrometeorológica de Sandanski), a vegetação das culturas de primavera ocorrerá em condições de boas reservas de humidade do solo nas camadas de 50 cm e 100 cm (superiores a 75-80% da capacidade de campo) – resultado das precipitações significativas e acima do normal em junho, que em alguns locais excederam 90-100 l/m² (Montana – 96 l/m², Veliko Tarnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrich – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardzhali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²).

Durante a primeira década, dependendo da precocidade dos híbridos de milho, ocorrerão várias fases: formação de folhas, emborrachamento, floração da espiga e emissão dos estigmas. No girassol, nas áreas de campo predominará a fase de floração, enquanto nas culturas dos campos mais elevados – formação da inflorescência. Nas leguminosas grão (feijão, soja), será observada a formação de vagens.

Durante a segunda e o início da terceira década, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo moderado, com temperaturas próximas e ligeiramente abaixo do normal para o período. As frequentes precipitações previstas para este período terão um efeito benéfico nas culturas de primavera que se encontram na fase reprodutiva do seu desenvolvimento, quando a necessidade de água aumenta acentuadamente (no milho, durante o período do emborrachamento ao estado leitoso, o consumo diário de água atinge 6-7 m³/decare). No início da terceira década de julho, parte dos híbridos precoces de milho nas áreas de campo entrará na fase de maturação leitosa. No girassol, ocorrerá a formação e o enchimento das sementes. No final do mês, nas culturas semeadas dentro do prazo agrotécnico, em alguns locais da Planície do Danúbio e nas regiões do sul, será observado o início da fase de maturação.

Durante a última semana de julho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo relativamente seco, quente e caloroso, o que exigirá a aplicação de um regime de irrigação adequado para híbridos tardios de milho e culturas hortícolas de produção tardia em campo aberto. As condições meteorológicas durante este período limitarão o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas, com exceção dos oídios nas culturas hortícolas e fruteiras, e do oídio (*uncinula*) nas videiras.

Em julho, não se deve subestimar a pulverização de proteção fitossanitária em fruteiras contra a segunda geração da traça-das-maçãs, afídeos e ácaros. Condições mais adequadas para a realização de tratamentos fitossanitários ocorrerão na maioria dos dias da primeira e terceira décadas, durante as horas mais frescas do dia.

Durante os períodos mais quentes de julho, com temperaturas máximas até 38-39°C, o risco de incêndios durante a colheita de cereais aumentará.