

# Previsão agrometeorológica para agosto

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 09.08.2020 Брой: 8/2020



*O período agrotécnico para a sementeira da colza começa na terceira década de agosto. Em agosto, para as variedades tardias de árvores de fruto, a atividade nociva da última geração de vermes da fruta não deve ser subestimada. O tempo relativamente seco durante a maioria dos dias do mês será um pré-requisito para o aumento das populações de ácaros. Nos vinhedos é necessário monitorizar a ocorrência e densidade das lagartas da terceira geração da traça-da-uva europeia.*

Em agosto, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas e precipitação próximas das normas climáticas para o mês.

No início de agosto, o desenvolvimento das culturas de primavera tardias na maioria das regiões do país prosseguirá sob um déficit de humidade do solo em aprofundamento. Exceções serão observadas em locais no Noroeste da Bulgária e no campo de Sófia, onde a precipitação em julho excedeu as normas mensais (Novo Selo - 84 l/m<sup>2</sup>, Vratsa - 128 l/m<sup>2</sup>, Montana - 88 l/m<sup>2</sup>, Sófia - 111 l/m<sup>2</sup>, Kyustendil - 72 l/m<sup>2</sup>, Dragoman - 56 l/m<sup>2</sup>) e aumentou o nível das reservas de humidade na camada de 50 e 100 cm do solo. Nas regiões ocidentais do país, a precipitação prevista durante a segunda metade da primeira década de agosto fornecerá humidade para a vegetação dos híbridos de milho mais tardios e das segundas culturas.

No Leste da Bulgária e nas regiões do sul, não é esperada precipitação durante a primeira década de agosto e, em alguns locais, a seca em aprofundamento colocará em causa a colheita das culturas de primavera cultivadas em condições não irrigadas. Em algumas destas regiões, como resultado da escassa precipitação de julho - em locais abaixo de 2-3 l/m<sup>2</sup> (Ruse, Shabla, Stara Zagora, Sliven, Karnobat, Burgas, Haskovo, Kardzhali), as reservas de humidade do solo na camada de 50 e 100 cm estão completamente esgotadas (estação agrometeorológica de Sliven).

Em meados de agosto, as altas temperaturas previstas, com valores máximos até 36-38°C, levarão a um encurtamento dos períodos interfásicos no desenvolvimento das culturas de campo tardias. Valores desta ordem, combinados com baixa humidade atmosférica, terão um impacto negativo na floração e fertilização nas culturas hortícolas da produção de campo tardia.

Durante a primeira década de agosto, os híbridos de milho mais precoces completarão o seu desenvolvimento, e os híbridos médio-precoces entrarão na fase de maturação leitosa. No girassol, na Planície do Danúbio e nas regiões do sul, será observada a fase de maturação. No final da segunda e início da terceira década, nas regiões de campo, o girassol estará predominantemente em maturação técnica. Durante a terceira década, os híbridos de milho médio-tardios entrarão na maturação cerosa. No arroz, será observada a fase de maturação leitosa, na soja - a fase de maturação, e no algodão - o início da abertura das cápsulas.

A probabilidade de precipitação, melhoria da condição físico-hídrica do solo nas camadas superiores e das condições para realizar a lavoura pré-sementeira das áreas destinadas à sementeira com colza de inverno, está prevista para a segunda metade da terceira década. O período agrotécnico para a sementeira da colza começa na terceira década de agosto.

Em agosto, para as variedades tardias de árvores de fruto, a atividade nociva da última geração de vermes da fruta não deve ser subestimada. O tempo relativamente seco durante a maioria dos dias do mês será um pré-requisito para o aumento das populações de ácaros. Nos vinhedos é necessário monitorizar a ocorrência e

densidade das lagartas da terceira geração da traça-da-uva europeia. A pulverização de proteção das plantas deve ser realizada durante as horas mais frescas do dia com produtos que tenham um intervalo pré-colheita apropriado, consistente com o período de maturação das culturas.

*Fonte: NIMH*