

No início de setembro, existem condições adequadas para a colheita das culturas de primavera e para a recolha da produção de frutas e legumes.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020



No final de agosto, as condições agrometeorológicas foram caracterizadas por temperaturas acima do normal e falta de precipitação, o que teve um impacto negativo nas fases finais de desenvolvimento das culturas de primavera tardia e dificultou a execução adequada do preparo do solo pré-semeadura.

Durante o período seguinte, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas das normas climáticas. No início do período, estão previstas precipitações economicamente significativas em

locais no Nordeste da Bulgária. Durante o período, o girassol estará predominantemente na fase de maturidade técnica. Nos híbridos de milho tardio, ocorrerão as fases de maturação leitosa e cerosa. O período ideal para a semeadura das áreas de colza de inverno está em curso. Em muitas regiões, a seca do solo irá impedir as atividades agrotécnicas e a semeadura da colza de inverno. Isso exigirá uma semeadura mais tardia, com o possível período de semeadura estendendo-se até o final do mês. Nos pomares de macieiras, monitora-se a atividade nociva da segunda geração da traça-das-maçãs e, se necessário, são realizados tratamentos contra a praga. A desinfecção de sementes é realizada em trigo e cevada destinados à semeadura de outono contra doenças transmitidas por sementes (cariose, carvão-nú, septoriose e doenças fúngicas do complexo *Fusarium*).

As condições serão adequadas para a colheita das culturas de primavera que atingiram a maturidade técnica, para a realização de atividades de proteção de plantas em culturas perenes e para a colheita de frutas e hortaliças.

Fonte: NIMH