

Previsão agrometeorológica para setembro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 *Брой:* 9/2020



Em setembro também, as condições agrometeorológicas no oeste da Bulgária diferirão significativamente das das regiões orientais do país.

No leste da Bulgária, elas serão determinadas por temperaturas acima do normal e precipitação abaixo do normal. Em muitos locais das regiões orientais, como resultado da prolongada seca estival, as culturas de primavera completaram sua vegetação prematuramente. Nessas áreas, a colheita do girassol e dos híbridos de milho mais precoces começou mais cedo do que as datas habituais, com rendimentos bem abaixo da média do país.

Em setembro, na maioria das regiões ocidentais, as fases finais de desenvolvimento das culturas agrícolas tardias ocorrerão sob temperaturas acima do normal, com precipitação próxima das normas climáticas e com boas reservas de umidade do solo no final do verão nas camadas de 50 e 100 cm (mais de 70% da capacidade de campo – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) – como resultado da precipitação acima do normal em agosto (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Sófia – 84 l/m², Kyustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Sandanski – 107 l/m²).

Durante o primeiro decêndio de setembro, precipitação de significado agrônômico é novamente prevista para a metade ocidental do país. Ela terá um efeito benéfico sobre as segundas safras e os híbridos de milho tardios, que estarão no estágio de maturação leitosa. Durante este decêndio, nas áreas de campo, os híbridos médio-tardios entrarão no estágio de maturação cerosa. Até meados do mês, parte dos híbridos tardios completará seu desenvolvimento. Durante o segundo decêndio, o arroz estará nos estágios de maturação cerosa e plena. Durante o terceiro decêndio, o estágio de maturação ocorrerá no algodão, amendoim, variedades de fruteiras de outono e variedades de uva mais tardias. Para o mês, os valores mínimos de temperatura previstos estão acima dos limiares críticos para as culturas de hortaliças, o que é um pré-requisito para obter produção adicional de hortaliças do cultivo de campo tardio.

Na maioria dos dias do segundo e terceiro decêndios, espera-se tempo relativamente seco e as condições serão adequadas para a limpeza das áreas das culturas de primavera.

Em setembro também, em grande parte das regiões orientais, a falta de umidade nas camadas superficiais do solo dificultará a realização qualitativa da aração profunda e do preparo pré-semeadura das áreas destinadas à semeadura com colza de inverno e culturas de cereais de inverno. O período ideal para a semeadura da colza é até o final do segundo decêndio do mês. No terceiro decêndio, começam nos campos de maior altitude as datas agrotécnicas de semeadura da cevada e do trigo.

Fonte: NIMH