

Outono quente e seco nos espera em outubro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2020 Брой: 10/2020



No início do outono, após a prolongada seca, as condições agrometeorológicas sofreram uma mudança positiva. As chuvas, em muitas partes do país superiores a 20–30 l/m² (Vratsa, Knezha, Oryahovo, Sófia, Dragoman, Kyustendil, Blagoevgrad, Sandanski, Kazanlak, Kardzhali, Elhovo, Razgrad, Burgas), aumentaram o teor de humidade nas camadas superficiais do solo, o que é de grande importância para a correta execução da preparação sazonal do solo. Existem exceções em partes da Planície Trácia e nas regiões orientais, onde as chuvas no final de setembro não tiveram significado económico.

Em outubro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima das normas climáticas e precipitação abaixo da norma mensal.

Durante o primeiro decêndio, não se prevê precipitação significativa e na maioria das áreas de campo as condições permitirão a realização da preparação pré-sementeira e a sementeira das culturas de outono. Este ano a seca dificultou a sementeira da colza de inverno e uma grande parte das áreas planeadas será semeada

em outubro – após os prazos agrotécnicos. Aumenta a probabilidade de que as searas semeadas mais tarde não consigam formar uma roseta (7–8 folhas) até ao final da sua vegetação outonal, uma fase em que a colza hiberna com sucesso.

Outubro é o período ideal para a sementeira das culturas cerealíferas de inverno. Na primeira metade do mês é o prazo agrotécnico para a sementeira do trigo no Norte da Bulgária, na segunda metade – para o Sul da Bulgária, e no terceiro decêndio – para as áreas ao longo da costa do Mar Negro.

Durante o primeiro decêndio, as temperaturas sazonalmente altas previstas, com valores máximos até 25–30°C, acelerarão a maturação das castas de vinha tardias e proporcionarão condições para obter produção adicional de culturas hortícolas da produção de campo tardia.

Após o tempo anormalmente quente na segunda metade de outubro, espera-se uma normalização gradual das condições térmicas. A precipitação prevista durante o segundo e a primeira metade do terceiro decêndio será de grande importância para o curso normal das fases iniciais de vegetação das culturas de outono semeadas. No final de outubro, dependendo das datas de sementeira, serão observadas as seguintes fases no trigo: emergência, terceira folha e início do afilhamento nas searas mais precoces, semeadas no início de outubro.

As temperaturas acima do normal previstas durante o mês criarão condições para um aumento da população de certas pragas – o rato-do-campo. Em outubro, as culturas de outono devem ser monitorizadas e, quando a população de roedores exceder o limiar económico de dano (2 colónias ativas por decare), é necessário o controlo com rodenticidas autorizados (grânulos de Fosfina) – iscos venenosos que são colocados nas entradas das colónias.

Na maioria dos dias do mês, as condições serão adequadas para a colheita da fruticultura. Nos pomares de macieira e pereira afetados pela sarna, para reduzir o inóculo é aconselhável, no início da queda das folhas, após a colheita dos frutos, realizar um tratamento com uma solução de ureia a 5%.

Para as espécies de fruta de caroço, após a queda massiva das folhas, recomenda-se a pulverização com uma calda bordalesa a 2% contra os agentes causadores da cribose, da podridão castanha precoce, da lepra do pessegueiro, etc.

Fonte: NIMH