

Melhoria das condições para a realização de atividades agrotécnicas sazonais em meados de outubro

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.10.2020 Брой: 10/2020



Em meados de outubro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e temperaturas próximas à média para a segunda década de outubro. As precipitações significativas do período passado excederam 40-50 l/m² em muitas partes do país (N. selo - 66 l/m², Lovech - 61 l/m², Pleven - 73 l/m², V. Tarnovo - 61 l/m², Svishtov - 51 l/m², Kazanlak - 73 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Stara Zagora - 54 l/m², Chirpan - 60 l/m², Karnobat - 63 l/m²), o que levou a uma melhoria acentuada das reservas de humidade do solo nas camadas superficiais e das condições para os estágios iniciais de vegetação das culturas de outono semeadas. No início do período, são esperadas mais precipitações e um aumento das reservas de humidade do solo na

camada de 50 cm. Em muitos locais do Oeste e Centro da Bulgária, elas atingirão níveis de até e acima de 75% da capacidade de campo. Uma mudança positiva nos níveis de humidade do solo também é esperada nas regiões nordeste do país, que foram as mais afetadas pela seca prolongada.

Em meados do período, prevê-se uma diminuição substancial das temperaturas e, nos campos de bacia – valores mínimos críticos para as culturas hortícolas sensíveis à geada. O desenvolvimento das culturas de outono semeadas no final da segunda e início da terceira década prosseguirá sob condições térmicas abaixo do normal. No trigo e cevada semeados durante a primeira década de outubro, prevalecerá o estágio de emergência. Nas culturas de cereais de inverno semeadas mais cedo, no final de setembro e início de outubro, será observada a formação de folhas (1–2 folhas).

Espera-se uma melhoria nas condições para a realização das atividades agrotécnicas sazonais, a mais importante das quais é a sementeira de trigo, no final do período. A próxima semana de sete dias coincide com o prazo agrotécnico para a sementeira de culturas de cereais de inverno no sul da Bulgária.

Durante a terceira década de outubro, nas culturas de trigo semeadas mais cedo, a densidade populacional de certas pragas deve ser monitorizada: rato-do-campo, crisomela do trigo, moscas dos cereais, etc., que causam sérios danos às culturas de cereais de inverno nos estágios iniciais da sua vegetação.

Fonte: NIMH