

Condições favoráveis para a realização de preparo sazonal do solo e para a semeadura de trigo e cevada no final de outubro

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.10.2020 Брой: 10/2020



Os 10–20 l/m² de precipitação que caíram durante o período anterior nas regiões de Vratsa, Knezha, Pleven, Lovech, Sófia, Razgrad mantiveram boa umidade nas camadas superficiais do solo e melhoraram as condições para o desenvolvimento das culturas de outono semeadas. Na segunda metade do período, em alguns locais (Kyustendil, Sófia, Dragoman, Kazanlak), foram registradas as primeiras geadas de outono e temperaturas mínimas críticas para culturas hortícolas de produção tardia em campo aberto.

Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas e acima da norma. Não são previstos valores mínimos críticos nem risco de geada. Durante o período, no trigo e na cevada, dependendo das datas de semeadura, serão observadas diferentes fases – desde a emergência até o início da formação das folhas. Na terceira década de outubro, está em andamento o prazo agrotécnico para a semeadura de culturas cerealíferas de inverno nas regiões ao longo da costa do Mar Negro.

Os volumes de precipitação registrados no final da primeira e durante a segunda década de outubro melhoraram a umidade do solo nas camadas superficiais. Na camada de cinquenta centímetros do solo, o teor de umidade do solo é de 75-80% da capacidade de campo. Isso melhorou as condições para o preparo do solo, a semeadura e o desenvolvimento inicial das culturas cerealíferas de inverno e da colza de inverno.

Durante a maioria dos dias do período, não são previstas precipitações significativas e as condições serão adequadas para a realização do preparo sazonal do solo, para a semeadura de trigo e cevada, para a colheita da safra de frutas de espécies frutíferas tardias e para a realização de atividades fitossanitárias em culturas permanentes. As condições permitirão a inspeção dos estandes de cereais de inverno quanto à presença e atividade nociva do rato-do-campo comum e do besouro-da-folha do trigo.

Fonte: NIMH