

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020



Após a prolongada seca, a precipitação acima do normal em outubro, que em alguns locais do Norte da Bulgária excedeu 70-80 l/m² (N. selo - 72 l/m², Montana - 71 l/m², Knezha - 80 l/m², Pleven - 94 l/m², Lovech - 79 l/m², Dobrich - 75 l/m²), levou a um aumento significativo das reservas de humidade nas camadas superiores do solo e a uma melhoria das condições para o progresso das fases iniciais da vegetação das culturas outonais semeadas. No final de outubro, nas estações agrometeorológicas de Silistra, Knezha, Sofia, Kyustendil, Novachene, Nikolaevo, Pavlikeni, Borima, Kazanlak, Pazardzhik, Plovdiv, na camada de 50 cm para as culturas de cereais de inverno, os níveis atingiram até e acima de 75-80% da capacidade de campo.

Em novembro, a precipitação prevista, em torno e acima da norma mensal, aumentará as reservas de humidade outonal nas camadas de solo de 50 e 100 cm.

Durante a primeira metade de novembro, o desenvolvimento das culturas de cereais de inverno e da colza de inverno prosseguirá a um ritmo moderado, com temperaturas próximas das normas climáticas. Durante este período, no trigo, dependendo das datas de sementeira, serão observadas diferentes fases – emergência, terceira folha e afilhamento nas culturas semeadas mais cedo, no final de setembro e início de outubro.

Prevê-se para o final da segunda década um arrefecimento e uma mudança substancial nas condições agrometeorológicas. Nos campos mais elevados, onde não é excluída precipitação na forma de neve, será observada uma cessação dos processos vegetativos nas culturas outonais.

Durante a terceira década de novembro, o desenvolvimento das culturas na maioria das regiões de campo prosseguirá a um ritmo abrandado, com temperaturas próximas do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno. Condições para processos vegetativos mais ativos no trigo, cevada e colza de inverno serão criadas nas regiões sul e sudeste do país. No final de novembro, predominarão as culturas de trigo e cevada na fase de terceira folha.

Este ano, a seca impediu a sementeira atempada da colza de inverno. Por esta razão, até ao final de novembro apenas parte das culturas, principalmente as semeadas no início do outono, mostrará o início da fase de formação da roseta (5-6 folhas).

Em novembro, as temperaturas mínimas previstas, até aos -7°C , estão acima dos níveis críticos para as culturas outonais que se encontram numa fase inicial do seu desenvolvimento.

Condições mais adequadas para a plantação de árvores de fruto ocorrerão durante a primeira metade do mês.

Fonte: NIMH