

Previsão agrometeorológica para o final de novembro e início de dezembro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 Брой: 11/2020



No final de novembro, o país acordou coberto de neve. Na noite passada, caiu a primeira neve da temporada no oeste da Bulgária. As temperaturas caíram abaixo de zero, fazendo com que a precipitação em Sofia, Razgrad, Pernik e Kyustendil se transformasse em neve. Espera-se que a camada de neve atinja até 5 cm, exceto na Planície Danubiana, onde sua profundidade será entre 10–15, em alguns lugares até 20 cm.

No final de novembro e início de dezembro, as condições agrometeorológicas serão cada vez mais dinâmicas. No início do período, serão determinadas por um clima ameno para a estação, com temperaturas médias diárias na maioria das áreas agrícolas próximas ou acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno e da colza de inverno.

Durante este período, prevê-se uma diminuição significativa das temperaturas e uma mudança nas condições agrometeorológicas. O resfriamento esperado levará a uma desaceleração e, nas áreas mais altas e no Pré-Bálcã, onde se prevê precipitação incluindo neve, a uma cessação dos processos vegetativos nas culturas de outono. Exceções ocorrerão em alguns lugares nas regiões sudeste e ao longo da costa do Mar Negro, onde será observada uma vegetação fracamente expressa das culturas de cereais de inverno.

No início de dezembro, nas lavouras de trigo semeadas dentro do período agrotécnico, em outubro, será observado o estágio de perfilhamento, no qual as culturas de cereais de inverno hibernam com sucesso. O estágio da terceira folha prevalecerá nas lavouras semeadas no início de novembro. As lavouras semeadas tardiamente, em meados de novembro, não estão bem estabelecidas e estão nos estágios de emergência e formação inicial das folhas. Na colza, o estágio de roseta, o estágio adequado para a hibernação, será observado nas lavouras semeadas no início do outono.

Durante o próximo período, são esperadas precipitações e uma melhoria das reservas de umidade do solo nas camadas superficiais. Como resultado da precipitação abaixo do normal em novembro, as reservas de umidade do solo nas camadas de 50 e 100 cm nos campos de trigo na maior parte do país estão anormalmente baixas para a estação – em alguns lugares nas regiões leste e extremo sul abaixo de 60% da capacidade de campo (estações agrometeorológicas de Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

No início do próximo período, as condições serão adequadas para o plantio de árvores frutíferas e para a realização de pulverizações de proteção fitossanitária de outono em frutíferas.

Para proteger as frutíferas do frio do inverno, destruir líquenes e musgos, e repelir o percevejo-marmorado-marrom e a mariposa-leopardo, é necessário tratar os troncos e galhos grossos das árvores com uma calda de cal a 20% à qual se adiciona uma pequena quantidade de argila.

Fonte: NIMH