

Previsão agrometeorológica para dezembro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.12.2020 Брой: 12/2020



No início de dezembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas abaixo do normal. A onda de frio prevista levará a uma desaceleração e, no norte da Bulgária e nos campos elevados, a uma cessação dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno e na colza.

Durante a primeira década, as condições permitirão a realização de trabalhos sazonais de preparo do solo (aração profunda das áreas destinadas à semeadura de primavera) e atividades fitossanitárias nas culturas permanentes. Em meados do período, são previstas precipitações generalizadas e uma melhoria na umidade do solo.

Durante a segunda metade da primeira década, prevê-se um aumento significativo das temperaturas, mas os seus valores médios diários, com exceção de alguns locais nas regiões sudeste e ao longo da costa do Mar Negro, não atingirão o mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas semeadas no outono.

Durante a maioria dos dias da segunda e terceira décadas, as temperaturas previstas, em torno e acima das normas climáticas, manterão as culturas de cereais de inverno em dormência na maior parte do país. Exceções são possíveis para o trigo e a cevada nas regiões extremo sul e sudeste. Nessas regiões, durante os períodos relativamente mais quentes, será observada uma retomada de curta duração dos processos vegetativos nas culturas semeadas no outono, mas não é esperada qualquer alteração nas fases fenológicas das culturas.

No início do inverno, no trigo, como resultado da semeadura outonal tardia e do aprofundamento do déficit hídrico do solo em novembro, serão observadas fases diferentes. Nos cereais de inverno semeados em outubro dentro do prazo agrotécnico, prevalecerá a fase de afilhamento. As culturas semeadas no início de novembro irão passar o inverno na fase de terceira folha, enquanto as semeadas tardiamente, na segunda metade de novembro, estarão na fase de emergência e formação inicial das folhas. Na colza, apenas parte das culturas conseguiu, durante a sua vegetação outonal, formar uma roseta, a fase em que as plantas passam o inverno com sucesso.

Em dezembro, os valores previstos das temperaturas mínimas, até -11°C , em condições sem cobertura de neve e com uma persistência mais prolongada, serão críticos para os cereais de inverno que se encontram na fase de emergência.

A precipitação prevista para dezembro, em torno da norma mensal, aumentará as reservas de humidade do solo na camada de 50 e 100 cm. Como resultado da precipitação abaixo do normal em novembro, em muitas partes do país na ordem dos 6–7 l/m², o nível das reservas de humidade do solo nos cereais de inverno está invulgarmente baixo para a segunda metade do outono. Em alguns locais no sul da Bulgária e em parte das regiões orientais, estão abaixo de 60% da capacidade de campo (estações agrometeorológicas de Sandanski, Haskovo, Sliven, Razgrad).

