

Previsão agrometeorológica no início do ano

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2021 Брой: 1/2021



As temperaturas acima do normal em dezembro, com valores máximos atingindo 17-18°C em muitos locais das áreas de planície (Knezha, Pleven, Lovech, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Pazardzhik, Plovdiv, Stara Zagora, Chirpan, Elhovo, Varna, Burgas), prolongaram os processos vegetativos nas culturas de outono. As temperaturas anormalmente altas desencadearam um inchaço prematuro das gemas em algumas espécies frutíferas de floração precoce (pêssego, cerejeira), o que levará a uma redução na sua resistência ao frio.

Durante o primeiro decêndio de janeiro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima do normal. No início do mês, em muitos locais das áreas de planície, os seus valores médios diários voltarão a exceder o mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno.

O arrefecimento e a cessação dos processos vegetativos nas culturas de outono são esperados durante a segunda metade do primeiro decêndio.

Durante o segundo e terceiro decêndios, as temperaturas previstas, próximas das normas climáticas, manterão os cereais de inverno e a colza em estado de dormência. A queda de neve generalizada esperada melhorará as condições de hibernação das culturas de outono. O trigo entrou no inverno em diferentes estágios fenológicos, como consequência da prolongada seca outonal e da sementeira atrasada. Os cereais de inverno semeados tardiamente, no final do outono, não estão bem estabelecidos e estão nos estágios de emergência e formação inicial das folhas em alguns locais das regiões sul do país (estações agrometeorológicas – Plovdiv, Haskovo, Lyubimets, Sliven, Yambol). Uma parte significativa das searas de trigo hibernará no estágio de três folhas. No estágio de afilhamento, que é o estágio adequado para a hibernação, estão os cereais de inverno semeados dentro do período agrotécnico ideal (estações agrometeorológicas – Bazovets, Novachene, Pavlikeni, Targovishte, Sandanski, Pazardzhik, Karnobat, Dolni Chiflik).

Em janeiro, as temperaturas mínimas previstas, até -15°C, em condições sem cobertura de neve e com persistência mais prolongada, serão críticas para os cereais de inverno não afilhados e para as searas de colza de inverno que não conseguiram formar uma roseta durante a sua vegetação outonal.

A precipitação esperada em janeiro, em torno e acima da norma, aumentará as reservas de humidade do solo na camada de 100 cm. A precipitação acima do normal em dezembro (Kardzhali – 194 l/m², Haskovo – 142 l/m², Sliven – 125 l/m², Stara Zagora – 123 l/m², Silistra – 109 l/m²) aumentou drasticamente as reservas de humidade nas camadas superiores do solo. No início do inverno, nos campos de trigo, as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm na maioria das áreas de planície atingiram níveis superiores a 85-90% da capacidade de campo (CC).

Em janeiro, condições mais adequadas para realizar a poda de inverno em vinhas e pomares ocorrerão durante o terceiro decêndio.

Fonte: NIMH