

Previsão agrometeorológica para fevereiro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2021 *Брой:* 2/2021



Durante a primeira década de fevereiro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima do normal e, em muitos locais das áreas de planície, os seus valores médios diários atingirão o mínimo biológico necessário para o reinício dos processos vegetativos nas culturas cerealíferas de inverno.

No final da primeira e início da segunda década, espera-se uma diminuição das temperaturas, o que impedirá a vegetação prematura nas culturas semeadas no outono e em algumas espécies frutíferas de caroço de floração precoce nas regiões de planície do país. Durante a segunda década, as temperaturas médias diárias previstas estarão próximas das normas climáticas e manterão as culturas agrícolas em hibernação em dormência.

Durante a terceira década, as condições agrometeorológicas serão novamente determinadas por temperaturas acima do normal, o que perturbará a dormência relativa das culturas semeadas no outono e a dormência forçada de algumas culturas frutíferas de floração precoce. No final de fevereiro, nas culturas cerealíferas de inverno em locais do sul da Bulgária e ao longo da costa do Mar Negro, serão criadas condições para uma vegetação tardia, mas não é esperada uma alteração significativa no estado fenológico das culturas. No trigo, serão observados os estágios de crescimento da terceira folha e do afilhamento. Nas regiões extremamente meridionais e sudeste, em algumas espécies frutíferas de caroço de floração precoce (amendoeira, pêssego, cerejeira), ocorrerá o inchaço das gemas e, em alguns locais, o início do seu rebentamento.

Em fevereiro, os valores previstos das temperaturas mínimas, até menos 12-13°C, em condições sem cobertura de neve e com uma duração mais prolongada, representarão um risco para as culturas cerealíferas de inverno semeadas tardiamente que pararam a vegetação no estágio de 2-3 folhas, e para as culturas de colza que não conseguiram formar uma roseta durante a sua vegetação outonal.

A precipitação esperada durante o mês, em torno e acima da norma, aumentará as reservas de humidade na camada de solo de dois metros. Como resultado da precipitação acima do normal em janeiro, que em muitos locais do país excedeu 140-150 l/m² (Vratsa -146 l/m², Shumen -147 l/m², Varna -154 l/m², Dragoman -158 l/m², Blagoevgrad -145 l/m², Sandanski -151 l/m², Haskovo -146 l/m², Kardzhali -176 l/m², Elhovo -163 l/m², Burgas -185 l/m²), as reservas de humidade do solo na camada de um metro nas culturas cerealíferas de inverno atingiram níveis próximos da capacidade de campo (CC).

Durante a primeira e segunda décadas de fevereiro, o elevado teor de humidade nas camadas superiores do solo limitará as possibilidades de realização de algumas atividades agrotécnicas – adubação de cobertura das culturas semeadas no outono com fertilizantes minerais nitrogenados, preparo do solo pré-semeadura de áreas destinadas à sementeira com culturas de primavera precoces (ervilha, ervilhaca, aveia, cevada de primavera). Condições mais adequadas para a poda em vinhas e pomares, e para pulverizações de proteção de plantas de inverno em pomares, estarão disponíveis na maioria dos dias da primeira e terceira décadas de fevereiro.