

# Cochonilha-branca - *Quadraspidiotus perniciosus* Comst

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 24.02.2021 Брой: 2/2021



## Danos:

A cochonilha suga a seiva da casca do tronco, ramos, galhos, frutos e folhas;

Sob infestação severa, a casca racha e morre, ramos individuais secam e, posteriormente, a árvore inteira morre;

Nos galhos e frutos, no local do dano, formam-se manchas de cor vinho a púrpura, as folhas caem, os brotos ficam deformados, a casca dos galhos racha e os frutos perdem sua aparência comercial.

A praga ataca cerca de 200 espécies de plantas – causando danos severos à macieira, pereira, ameixeira, pessegueiro e damasqueiro.

Passa o inverno como uma larva de primeiro ínstar na casca dos galhos e do tronco, que completa seu desenvolvimento durante a floração da macieira.

Dissemina-se através de material de plantio.

## **Controle:**

Durante o período de dormência, as medidas de controle são direcionadas contra o estágio de hibernação – as larvas;

Até o inchamento das gemas das macieiras e pereiras, o tratamento deve ser realizado com um óleo de proteção de plantas, que atua por asfixia – forma uma película de óleo que cobre a escama da larva hibernante e a priva de oxigênio, resultando em sua morte;

Ao tratar com óleo de proteção de plantas, os ovos hibernantes do ácaro-vermelho-europeu também são destruídos, em uma densidade estabelecida de 60–80 ovos hibernantes por 10 cm de galho na macieira e 40–50 ovos por 10 cm de galho na pereira, além de proporcionar ação contra cochonilhas, psílídeos, gorgulhos, etc.;

O produto pode ser adicionado à solução de pulverização fungicida ou usado sozinho.