

Previsão agrometeorológica para março

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.03.2021 Брой: 3/2021



Após a curta vaga de frio no início de março, durante a maioria dos dias da primeira quinzena do mês, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas das normas climáticas e do mínimo biológico necessário para o desenvolvimento das culturas de cereais de inverno. Neste período, serão criadas condições para o início da vegetação nas culturas de outono-inverno nas regiões sul do país.

Prevê-se um aumento substancial das temperaturas e uma ativação dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno e nas plantações perenes na segunda metade da segunda década do mês.

Durante a terceira década, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo acelerado, sob condições térmicas acima do normal. No final do mês, o trigo e a cevada estarão predominantemente na fase

de afilhamento, com uma transição para o alongamento do colmo nas searas em algumas das regiões sul e sudeste do país. Na colza de inverno, que hibernou na fase de roseta, a ramificação ocorrerá em grande escala.

Em março, serão observados vários estágios fenológicos nas fruteiras – desde o inchamento e rebentação das gemas até às fases de cacho verde e floração nas espécies de frutos de caroço de floração precoce – amendoeira, damasqueiro, pessegueiro, nas regiões sul e em locais da Planície do Danúbio, onde as temperaturas acima do normal em fevereiro provocaram um desenvolvimento prematuro nos pomares.

Em março, as temperaturas mínimas previstas, até -7°C, representarão um risco para as fruteiras mais avançadas nas fases de formação de gemas e floração.

A precipitação esperada em março, próxima da norma mensal, aumentará as reservas de humidade do solo, inclusive na camada de dois metros. No final de fevereiro, na maioria das regiões agrícolas, as reservas de humidade na camada de um metro sob as culturas de cereais de inverno estavam em níveis próximos da capacidade de campo. Foram observadas exceções em alguns locais da Planície do Danúbio – estações agrometeorológicas: Bazovets, Novachene, Pavlikeni, e nas regiões sudeste – estações agrometeorológicas: Sliven, Karnobat, Dolni Chiflik, onde as reservas de humidade na camada de um metro sob trigo estavam abaixo de 90% da capacidade de campo.

Em março, condições adequadas para a realização de atividades agrotécnicas sazonais – preparação do solo pré-sementeira e sementeira de culturas de primavera precoces e médias-precoces (ervilhaca, aveia, cevada de primavera, ervilha); tratamentos preventivos pré-floração em pomares contra uma série de doenças – murcha da flor (podridão parda precoce), cribramento, enrolamento das folhas do pessegueiro, sarna, etc. – estarão disponíveis durante a maioria dos dias da primeira e durante a segunda metade da terceira década do mês.

A previsão de precipitação frequente durante a segunda e a primeira metade da terceira década de março manterá um alto teor de humidade nas camadas superficiais do solo e, por esta razão, em alguns locais das regiões sul, os prazos agrotécnicos para a sementeira do girassol serão perdidos. O período ótimo para a sementeira do girassol no Sul da Bulgária ocorre entre 15 e 20 de março, e na Planície do Danúbio começa em meados da terceira década do mês (25.03–5.04).

Fonte: NIMH