

No início de abril, observa-se uma progressão ativa dos processos de vegetação nas culturas agrícolas.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 Брой: 4/2021



Apesar da queda de neve esperada nas montanhas e do resfriamento previsto para o início de abril, as condições agrometeorológicas serão determinadas por valores de temperatura média diária que permitirão o curso ativo dos processos de vegetação nas culturas agrícolas. No início de abril, não são previstas temperaturas mínimas críticas para as espécies frutíferas que estão avançadas em seu desenvolvimento fenológico.

Durante o período, o trigo e a cevada no sul da Bulgária estarão na fase de alongamento do colmo. Nas culturas da Planície do Danúbio, ocorrerão a fase de perfilhamento, a transição para o alongamento do colmo e o início do alongamento do colmo. Para as espécies frutíferas, as fases fenológicas observadas serão a brotação, a gemação e a floração. Na videira, ocorrerão o fluxo de seiva e o inchaço das gemas.

Durante o período, serão criadas condições para a realização das operações agrotécnicas sazonais – semeadura do girassol e preparos pré-plantio do solo para as culturas de primavera. Nas culturas permanentes, continuarão os tratamentos contra a sarna nas espécies de frutas de pomóideas, contra a murcha das flores (podridão parda precoce) e a mancha bacteriana nas espécies de frutas de caroço, e o enrolamento das folhas no pêssigo. Para alcançar o efeito máximo da pulverização, as atividades de proteção das plantas devem ser realizadas em clima calmo, com uma velocidade de vento admissível de até 2–3 m/s.

A precipitação prevista durante os primeiros dias do período limitará temporariamente as possibilidades de realização de atividades agrotécnicas.

Fonte: NIMH