

Previsão agrometeorológica para o mês de abril

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2021 Брой: 4/2021



Durante a primeira década de abril, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima das normas climáticas. As condições térmicas acima do normal previstas acelerarão os processos de vegetação das culturas cerealíferas de inverno, e grande parte dos talhões nas áreas de campo entrará massivamente na fase de alongamento do colmo. Na colza, serão observados o afilhamento e o início da fase de botão floral.

Durante a maioria dos dias da década, não são esperadas precipitações significativas e as condições em muitas partes do país permitirão a realização da preparação do solo pré-semeadura e a sementeira do girassol. A primeira

década de abril é o prazo agrotécnico para a sementeira do girassol no Norte da Bulgária.

No final da primeira e início da segunda década, está prevista uma descida das temperaturas, uma estabilização do tempo e uma alteração substancial das condições agrometeorológicas. Durante este período, são esperadas precipitações significativas e um aumento das reservas de humidade do solo, inclusive na camada de dois metros. No início da primavera, na maioria das áreas de campo, as reservas de humidade do solo para o trigo na camada de um metro atingiram níveis superiores a 90% da capacidade de campo. Exceções ocorrem em algumas regiões orientais – postos agrários de Razgrad, Dolni Chiflik, Sliven – onde o nível das reservas de humidade é inferior, abaixo de 80% da capacidade de campo.

No final da primeira e início da segunda década de abril, está prevista uma estabilização de curta duração do tempo e condições adequadas para a realização de certas pulverizações fitossanitárias urgentes em pomares: na fase de botão floral em pomóideas (macieira, pereira) contra a sarna; tratamentos pós-floração em algumas fruteiras de caroço de floração precoce contra a murchidão das flores (podridão castanha precoce) e a coryneum; em cerejeira e ginjeira contra a doença fúngica mais perigosa – a cilindrosporiose (a chamada ferrugem branca), entre outras.

Durante a segunda década de abril, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo mais lento, sob condições térmicas abaixo do normal. No final da década, está prevista uma maior probabilidade de formação de geadas, o que deve ser tido em conta no endurecimento das mudas de hortícolas e tabaco. As temperaturas mínimas previstas, em alguns locais até -2 a -3°C, serão críticas para as flores e os frutos jovens das árvores de fruto se persistirem por mais tempo.

No início da terceira década, é esperado um aquecimento e, nas áreas de campo, as temperaturas do solo na camada de dez centímetros atingirão valores adequados para a sementeira do milho grão.

Durante a terceira década, a vegetação das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo moderado, com temperaturas próximas das normas climáticas.

Durante este período, nas culturas cerealíferas de inverno haverá uma transição do alongamento do colmo para o espigamento e a fase de espigamento. Na colza, predominará a fase de floração.

Em abril, as precipitações frequentes criarão condições para um aumento do fundo infeccioso de uma série de doenças fúngicas em pomares – murchidão das flores (podridão castanha precoce), sarna, coryneum, enrolamento das folhas do pessegueiro, entre outras. Condições mais adequadas para a realização de pulverizações fitossanitárias em fruteiras ocorrerão durante a maioria dos dias da primeira e durante a primeira metade da terceira década.

Fonte: NIMH