

Previsão agrometeorológica para o mês de maio

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2021 *Брой:* 5/2021



Este ano, o clima frio durante a primeira metade da primavera atrasou o desenvolvimento das culturas agrícolas. Durante a maior parte dos dias de maio, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável.

A previsão de temperaturas acima do normal no início de maio acelerará os processos vegetativos nas culturas de outono/inverno e nas culturas de primavera já semeadas. Durante a primeira década do mês, ocorrerão vários estágios no trigo: alongamento do colmo, transição para o espigamento e espigamento. Na cevada das regiões sul (Estação Agrometeorológica de Sandanski), será observado o estágio de floração. Na colza, ocorrerão a floração, a fertilização e a formação das vagens.

Após o tempo quente do início do mês, prevê-se a normalização das condições térmicas para a segunda metade da primeira década. A precipitação esperada durante este período atrasará a implementação de algumas atividades agrotécnicas sazonais – conclusão da sementeira do milho grão, preparação do solo pré-semeadura e sementeira das culturas de primavera termofílicas tardias (feijão, algodão, amendoim, etc.).

Durante a segunda e terceira décadas, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo moderado, com temperaturas médias diárias próximas das normas climáticas. *A precipitação esperada na segunda metade de maio manterá um nível muito bom de reservas de humidade nas camadas de solo de 50 cm e 100 cm, acima de 85% da capacidade de campo (CC). Terá um efeito benéfico nas culturas cerealíferas de inverno, nas quais estarão em curso a formação e o enchimento do grão. No final de maio, em parte dos trigais e cevadaís das regiões sul, será observado o início do estágio de maturação leitosa.*

Durante o mês, ocorrerá a formação de folhas no milho e no girassol. No final de maio, no girassol semeado dentro do prazo agrotécnico, será observada a formação da inflorescência.

Nas culturas frutícolas, ocorrerá a formação e o aumento dos frutos. Na videira, será observada a emergência da inflorescência, e no final do mês – o início da floração – estágios estes críticos para a infecção pelo míldio.

A precipitação frequente em maio criará condições para o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas: ferrugens (castanha, amarela) e septoriose no trigo; míldios nas culturas hortícolas e na videira; queima das flores, mancha bacteriana e sarna nas árvores de fruto, etc. Durante o mês, condições mais adequadas para a realização de pulverizações de proteção das plantas ocorrerão no início da primeira, no meio da segunda e no início da terceira década.

Em maio, não são previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas agrícolas, mas a probabilidade de granizo permanece aumentada. Em caso de danos por granizo, recomenda-se que as culturas afetadas sejam tratadas na primeira oportunidade com fungicidas à base de cobre para uma cicatrização mais rápida das feridas e para reduzir o risco de infecções secundárias.

Fonte: NIMH