

# Sistema de controle de pragas para cebolas

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



**Praga – Mosca-da-cebola** *Delia antiqua*

## **Danos**

As larvas eclodidas perfuram a base das folhas, roem uma galeria no caule e movem-se para o bulbo. As plantas danificadas ficam com crescimento atrofiado, amarelecem, tombam, podem ser arrancadas com facilidade e, por fim, secam. Como resultado do dano, os tecidos fermentam e emitem um cheiro desagradável de cebola podre.

## **Controle**

O início do voo das moscas é esperado na segunda década de abril. As plantas infestadas devem ser imediatamente removidas e destruídas. O primeiro tratamento deve ser realizado durante o período de voo em massa, que coincide com a floração da ginjeira. Limiar económico de dano: *5 moscas/10 varreduras com rede entomológica*.

## **Praga – Trips-do-tabaco** *Thrips tabaci*

### **Danos**

Os trips sugam a seiva das folhas e aparecem manchas esbranquiçadas sobre elas. Sob infestação pesada, as manchas fundem-se e a folha inteira fica branca. Nas manchas, podem ser observados pequenos pontos pretos – as excreções da praga.

### **Controle**

Em abril, deve-se prestar atenção ao trips-do-tabaco desde o seu primeiro aparecimento, quando ele se move de restos vegetais ou plantas daninhas para a cebola.

## **Praga – Mildio** *Peronospora destructor*

### **Danos**

Manchas elípticas, de cloróticas a verde-claro, aparecem nas folhas, as quais, em clima húmido, ficam cobertas por um crescimento esporulante violeta. Condições favoráveis para a infeção são criadas a temperaturas de 3–25 °C e na presença de gotículas de água retidas nas plantas.

### **Controle**

Erradicação de plantas voluntárias e primariamente infetadas. Após a deteção das primeiras manchas da doença, devem ser realizados tratamentos de vegetação. Em períodos de tempo seco, os tratamentos podem ser realizados com menor frequência.

Ao tratar culturas de cebola, deve ser adicionado um adjuvante!