

Previsão agrometeorológica para junho

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 *Брой:* 6/2021



Durante a primeira década de junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável. No início do mês, estão previstas precipitações significativas e uma melhoria das reservas de humidade do solo na camada de 50 e 100 cm. Na maior parte do país, as reservas de humidade do solo para as culturas de primavera atingirão níveis até, e na Planície do Danúbio – mesmo acima de 80-85% da capacidade de campo. A humidade do solo permanecerá mais baixa em algumas das regiões orientais e meridionais, onde a precipitação de maio foi menor, em locais abaixo de 50-60% das normas mensais – G. Delchev, Sliven, St. Zagora, Varna, Karnobat, Burgas, Ahtopol.

No início de junho, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo mais lento, sob condições meteorológicas frescas para a época. Durante a primeira década, ocorrerá o enchimento do grão e a fase de

maturação leitosa no trigo. No final da década, na cevada em alguns locais das regiões do sul, também será observada a maturação cerosa – Sandanski. Os aguaceiros limitarão as possibilidades de realizar pulverizações de proteção das plantas contra o míldio nas videiras e culturas hortícolas, a sarna e a podridão castanha nas árvores de fruto, e contra o percevejo-das-espigas nas culturas cerealíferas de inverno. Durante a segunda metade do período, mantém-se a probabilidade de granizo e precipitação local, representando um risco de danos para as culturas agrícolas. O risco de acamamento nas searas de trigo e cevada é elevado.

Durante a segunda década, está prevista uma melhoria e normalização das condições térmicas. Nesta década, a cevada completará o seu desenvolvimento. Na colza, ocorrerá a fase de maturação.

Durante a terceira década, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá com temperaturas próximas das normas climáticas. Durante este período, no trigo nas regiões de campo, será observada a maturação cerosa.

No final de junho, parte das culturas de primavera entrará nas fases reprodutivas do seu desenvolvimento. Nos híbridos precoces de milho, será observada a fase de emborrachamento, e no girassol semeado dentro do prazo agrotécnico – o início da fase de floração.

Na maioria dos dias do mês, a elevada humidade atmosférica manterá condições favoráveis para o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas: sarna, cribramento e oídio nas árvores de fruto; míldios nas culturas hortícolas e videiras, etc. Nas videiras, o período interfásico desde a floração das inflorescências até à formação do fruto com o tamanho de uma ervilha é crítico para a infeção com míldio e oídio. Condições mais adequadas para realizar as extremamente importantes pulverizações de proteção das plantas ocorrerão durante a primeira metade da segunda e durante a terceira década de junho.

Ao longo do mês, a probabilidade de granizo permanecerá aumentada. Em caso de danos por granizo, é aconselhável que as culturas frutícolas e hortícolas afetadas sejam tratadas com fungicidas à base de cobre na primeira oportunidade.