

No final de junho – altas temperaturas e precipitação local

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 *Брой:* 6/2021



No final de junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo quente e, em alguns locais – calor intenso. O desenvolvimento das culturas agrícolas na maioria das áreas de campo ocorrerá sob boas e muito boas reservas de umidade nas camadas de solo de 50 e 100 cm (acima de 80–85% da capacidade de campo) como resultado das precipitações significativas das últimas duas semanas, que em alguns locais no centro e leste da Bulgária atingiram até mais do dobro das normas de junho (Veliko Tarnovo – 118 l/m², Ruse – 115 l/m², Razgrad – 108 l/m², Silistra – 116 l/m², Dobrich – 111 l/m², Karnobat – 96 l/m²). Exceções ocorrerão em algumas das regiões mais a oeste e sul, onde foram registradas precipitações abaixo do normal e as reservas de umidade do solo no início do verão são insatisfatórias para as culturas de primavera na camada de 50 cm –

abaixo de 65% da capacidade de campo (estações agrometeorológicas: Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

Durante o período, o girassol estará na fase de formação da inflorescência. No início de julho, nas culturas semeadas dentro do prazo agrotécnico, principalmente nas regiões sul, também será observado o início da fase de floração.

No milho, prosseguirá a formação das folhas. Nos híbridos mais precoces, serão observadas as fases de emborrachamento e floração do pendão. No final de junho e início de julho, as lavouras de milho devem ser inspecionadas quanto à presença de uma das pragas mais importantes – a broca-europeia-do-milho, e quando a densidade da praga exceder o limite econômico de dano, o tratamento oportuno é imperativo.

As altas temperaturas previstas para a última semana de junho limitarão o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas, com exceção dos oídios.

Durante o próximo período, o trigo completará seu desenvolvimento mesmo nos campos mais altos.

Durante o período, são novamente previstas precipitações localizadas, com maior probabilidade no leste da Bulgária, onde o início da campanha de colheita será adicionalmente dificultado.

Fonte: NIMH