

Déficit de umidade do solo em agosto será

Автор(и):

Дата: 09.08.2021 Брой: 8/2021



Após o calor prolongado de julho, durante os primeiros dias de agosto as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas por tempo seco e quente. As temperaturas máximas extremamente altas previstas para o início do mês, acima de 39-40°C, irão perturbar o curso normal dos processos fisiológicos nas culturas agrícolas. Valores desta ordem, combinados com baixa humidade do ar, causarão esterilidade nas culturas hortícolas da produção de campo tardia.

No início de agosto, dependendo da precocidade das variedades híbridas de milho, serão observadas as fenofases leitosa, cerosa e de maturação completa. No girassol, ocorrerão as fases de desenvolvimento e maturação das sementes. Na videira, será observada a coloração e o amolecimento das bagas. Em muitas regiões do país, as condições irão limitar as possibilidades de preparo do solo devido à falta de humidade no

solo. É aconselhável realizar a gradagem de restolho nas áreas liberadas do trigo e da cevada, a fim de destruir a vegetação infestante, quebrar os capilares do solo e preservar a humidade do solo. As condições para a realização de pulverizações de proteção de plantas em culturas hortícolas e plantações perenes existirão principalmente de manhã, durante as horas mais frescas do dia. A probabilidade de granizo e danos às culturas agrícolas também permanece.

Em agosto, o fator limitante para o desenvolvimento das culturas agrícolas tardias será o déficit de humidade no solo. A previsão de precipitação abaixo do normal durante o mês, no contexto da seca que se desenvolveu no final de julho, não terá significado económico particular, o que tornará necessário a aplicação de regas aumentadas para as culturas agrícolas tardias. No início de agosto, serão necessárias taxas de rega mais elevadas para as segundas culturas e híbridos de milho mais tardios, nos quais ocorrerá a formação e enchimento do grão, bem como para as variedades de árvores de fruto e videiras mais tardias, que estão em processo de aumento do fruto.

As condições térmicas acima do normal previstas para o mês levarão a um encurtamento dos períodos interfásicos no desenvolvimento das culturas de campo tardias. Durante a primeira década, parte dos híbridos precoces de milho completará o seu desenvolvimento, e nos médios-precoces será observada a fase de maturação leitosa. No girassol, na Planície do Danúbio e nas regiões do sul, ocorrerá a fase de maturação. Em meados da segunda década, grande parte dos pés de girassol nas áreas de campo entrará em maturação técnica. Durante a terceira década, nos híbridos de milho médios-tardios predominará a maturação cerosa, e na soja a fase de maturação.

As condições meteorológicas em agosto irão limitar o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas, com exceção dos oídios nas culturas hortícolas, variedades tardias de árvores de fruto e videiras. As pulverizações de proteção de plantas durante o mês devem ser realizadas durante as horas frescas do dia com produtos que tenham um intervalo pré-colheita apropriado, consistente com o período de maturação das culturas.

Em agosto, o solo seco e compactado em muitos locais das regiões de campo do país dificultará a realização com qualidade da lavoura profunda e do preparo pré-semeadura das áreas destinadas à sementeira com colza de inverno.