

Traça-da-tomateira

Автор(и): Весела Шишкова, Главен редактор

Дата: 26.01.2014 Брой: 1/2014



Nos últimos anos, uma das principais pragas do tomate tem sido a traça-do-tomateiro (*Tuta absoluta*). Danos aos frutos são observados mesmo em níveis de infestação relativamente baixos. A traça ataca as plantas durante todo o período vegetativo – desde as mudas até a colheita, pois desenvolve muitas gerações por ano – 9–10 em estufas aquecidas e 4–5 no campo, que se sobrepõem.

As traças adultas são ativas à noite e durante o dia escondem-se entre as folhas. Os danos são causados pelas larvas. Elas preferem principalmente as folhas e caules das plantas, mas também atacam os frutos. Sinais da presença da traça na estufa são minas curtas e largas nas folhas, nas quais podem ser vistas larvas e excrementos em forma de pilhas, geralmente localizados em uma das extremidades.

Estratégia para o controle da praga

A traça-do-tomateiro é uma praga extremamente agressiva, que se espalhou rapidamente e em 2011 foi detectada em 21 distritos do país. A preparação do Programa Nacional de Medidas para o Controle da Traça-do-Tomateiro Tuta absoluta é necessária para limitar as perdas e a disseminação da praga no país, definindo um conjunto de medidas de monitoramento e controle. Este programa destina-se a especialistas – agrônomos e agricultores – em suas atividades de proteção das plantas contra a praga.

Colocação de armadilhas com feromônios para detecção precoce da praga e adoção de medidas de controle oportunas. Em baixa densidade populacional, um dos agentes biológicos *Macrolophus pygmaeus* ou *Nesidiocoris tenuis* pode ser introduzido.

Produtos fitossanitários autorizados

Avant 150 EC - 25 ml/da, Alverde SC - 0,1%, Altacor WG - 8–12 g/da, Ampligo 150 ZC - 40 ml/da, Affirm 095 SG - 150 g/da, Voliam Targo 063 SC - 0,08%, Decis 2.5 EC - 0,05%, Decis 2.5 EC New - 0,05%, Confidor Energy OD - 0,08%, Coragen 20 SC - 14–20 ml/da, Lannate 20 SL - 125 ml/da, Lannate 25 WP - 100 g/da, Mospilan 20 SP - 0,02%, Neem Azal T/S - 0,3%, Picador 20 SL - 0,05%, Rapax - 100–200 ml/da, Sineis 480 SC - 10–25 ml/da (20–25 ml/100 l de água), Uarrant 20 SL - 50 ml e Hipo SP - 0,02%