

No início de julho – tempo quente e seco

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.07.2022 Брой: 7/2022



Durante a segunda década de julho, não foi registrada precipitação de significado agrícola sobre as áreas de campo do país. Isso aprofundou o déficit das reservas de umidade do solo na camada de um metro no Oeste e Centro-Sul da Bulgária.

No final de julho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo quente e seco. Temperaturas acima do normal com valores máximos acima de 35°C, em locais atingindo e ultrapassando 40°C, irão perturbar o curso normal dos processos fisiológicos e levarão a um encurtamento dos períodos interfásicos nas culturas agrícolas. Durante o período, dependendo da duração do período de vegetação dos híbridos individuais, o milho estará nas fases de emborrachamento, floração, pendoamento, formação de grãos

e, em alguns locais na Planície do Danúbio, também em maturação leitosa (estações agrometeorológicas de Kneja, Novachene e Silistra).

No girassol, ocorrerão a floração, a formação e o enchimento das sementes. O tempo quente e seco durante o período exigirá a aplicação de taxas de irrigação aumentadas para as culturas hortícolas e para o milho.

Durante o período, em muitos locais nas áreas de campo, a ausência de umidade na camada arável dificultará e atrasará a implementação adequada das operações sazonais de preparo do solo.

Nas culturas perenes e hortícolas, continua a pulverização de proteção de plantas contra doenças e pragas – contra o oídio e a traça-da-uva nos vinhedos, contra o oídio, os vermes das frutas e os ácaros nas fruteiras, e contra o oídio e os ácaros nas culturas hortícolas. Ao realizar o controle químico, devem ser aplicados produtos com um curto intervalo pré-colheita, durante as horas mais frescas do dia.

Fonte: NIMH