

Agosto – déficit de humidade do solo e condições térmicas acima do normal

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2022 *Брой:* 8/2022



Durante a maior parte de agosto, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo relativamente seco e quente. Ao longo do mês, o déficit de humidade do solo será um fator limitante para o desenvolvimento das culturas agrícolas tardias.

No final de julho, como resultado de precipitação abaixo do normal, na maioria das regiões agrícolas o teor de humidade produtiva na camada de 50 cm do solo sob as culturas de primavera estava esgotado, e na camada de 100 cm era escasso, abaixo de 50% da capacidade de campo. Em alguns locais das regiões do sul (estações agrometeorológicas de Pazardzhik, Lyubimets, Sliven), a humidade produtiva estava ausente mesmo na camada de um metro do solo.

Durante a primeira década de agosto, não está prevista precipitação de significado agronómico, o que tornará necessário um aumento nas taxas de rega para os híbridos de milho mais tardios que se encontram nas fases de formação e enchimento do grão. Taxas de rega mais elevadas também serão necessárias para as culturas hortícolas e para as variedades outonais de árvores de fruto, que passarão por um crescimento intensivo dos frutos durante o mês.

As condições térmicas acima do normal previstas para a maioria dos dias de agosto levarão a um encurtamento dos períodos interfásicos no desenvolvimento das culturas agrícolas tardias. Durante o mês, ocorrerão vários estágios de maturação no milho. Na primeira década, os híbridos mais precoces completarão o seu desenvolvimento, enquanto os médio-precoces estarão no estágio de maturação leitosa. No final da terceira década, a maturação cerosa predominará nos híbridos de milho médio-tardios. Nas regiões agrícolas, o estágio de maturação no girassol será observado em massa em meados do mês.

Em agosto, as temperaturas máximas previstas, na faixa de 35-40°C, terão um impacto negativo na floração e fertilização das segundas culturas de produção tardia (pepinos, feijão verde, abobrinha).

O tempo seco durante a maioria dos dias do mês limitará o desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas, com exceção dos oídios nas culturas frutícolas e hortícolas.

Em agosto, a atividade nociva da última geração de traças da fruta não deve ser subestimada nas variedades tardias de árvores de fruto. As condições durante o mês serão favoráveis para um aumento das populações de ácaros. Em vinhas, é necessário monitorizar a ocorrência e densidade das lagartas da terceira geração da traça-da-uva. Os tratamentos de proteção das plantas durante o mês devem ser realizados nas horas mais frescas do dia com produtos que tenham um intervalo de pré-colheita apropriado, de acordo com o período de maturação das culturas.

Fonte: NIMH