

Em setembro – bom nível de reservas hídricas e condições adequadas para a realização de trabalhos sazonais de campo

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.09.2022 Брой: 9/2022



Durante a primeira metade da primeira década de setembro, as condições agrometeorológicas permanecerão instáveis, com precipitações frequentes que manterão boas reservas de humidade nas camadas superficiais do solo na maioria das áreas agrícolas. A precipitação generalizada que caiu durante a terceira década de agosto, excedendo em muitas partes do país 30-40 l/m² (Lom - 44 l/m², Oryahovo - 54 l/m², Knezha - 53 l/m², Plovdiv - 36 l/m², Kardzhali - 72 l/m², Chirpan - 67 l/m², Ahtopol - 60 l/m²), aumentou as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm. Esta precipitação chegou tarde para parte das culturas de primavera cultivadas em regime

de sequeiro, que, como resultado do déficit de humidade do solo, completaram a sua vegetação prematuramente.

Durante a primeira e a maioria dos dias da segunda década de setembro, o desenvolvimento das culturas agrícolas tardias que superaram os efeitos adversos da seca estival prosseguirá a um ritmo acelerado, com temperaturas próximas e acima das normas climáticas. No início de setembro, será concluído o desenvolvimento dos híbridos de milho de média-tardios. Nos híbridos tardios, será observada a fase de maturação leitosa, e em meados do mês – a fase de maturação cerosa.

No início da segunda década, está novamente prevista precipitação e espera-se um risco aumentado para o desenvolvimento de agentes patogénicos que causam apodrecimento da colheita de frutos e uvas maduras e em maturação - podridão cinzenta nas uvas, podridão parda tardia nos frutos das variedades outono-inverno das árvores de fruto.

Durante o mês, períodos com tempo relativamente seco e condições mais favoráveis para a realização dos trabalhos de campo sazonais: colheita do girassol e dos híbridos de milho mais precoces, execução da lavoura profunda e da preparação do solo pré-sementeira das áreas destinadas à sementeira com culturas de inverno, e a sementeira da colza de inverno, são esperados durante a segunda metade da primeira e a maioria dos dias da segunda década. Até ao final da segunda década de setembro, aplicar-se-ão os prazos ótimos agrotécnicos para a sementeira da colza.

Durante a terceira década de setembro, está prevista uma estabilização do tempo, uma diminuição substancial das temperaturas e as alterações transitórias nas condições agrometeorológicas típicas do final do verão e início do outono. A precipitação esperada durante este período fornecerá humidade para uma emergência normal das plantas de colza de inverno semeadas dentro dos prazos agrotécnicos.

Na fase de emergência, os danos na colza são causados pela pulga-do-caule das crucíferas (indivíduos adultos) e pela mosca-serra da colza (falsas lagartas), o que exige que as plantas emergidas sejam monitorizadas quanto à presença destas pragas e, quando a sua densidade exceder o nível de dano económico (NDE para a pulga-do-caule - 2 besouros por m²; NDE para a mosca-serra da colza - 2-3 falsas lagartas por m²), deve ser realizado um tratamento atempado.

Não estão previstas geadas nas áreas agrícolas até ao final de setembro, o que proporcionará condições para a formação de produção adicional a partir de culturas hortícolas da produção tardia de campo.

Fonte NIMH