


No final de setembro e início de outubro, as condições serão favoráveis para o desenvolvimento de patógenos que causam podridão na cultura ainda não colhida.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.09.2022 Брой: 9/2022



Em setembro, em alguns locais das regiões do sul (Haskovo, Pazardzhik, Chirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas), ocorreram precipitações economicamente significativas entre 15–20 l/m², que forneceram a humidade necessária para a emergência da colza de inverno semeada dentro do prazo agrotécnico.

Prevê-se uma melhoria nas condições agrometeorológicas no final do mês. Durante o período, os híbridos tardios de milho completarão o seu desenvolvimento e atingirão a maturação plena. Nas variedades tardias de árvores de fruto e vinhas, os processos de maturação prosseguirão com temperaturas próximas das normas climáticas.

Durante o período, não são esperadas precipitações significativas e as condições permitirão a conclusão da colheita das culturas de primavera tardias, a realização da lavoura pré-semeadura nas áreas destinadas à sementeira de trigo e cevada, e a aplicação de fertilizantes minerais. Durante o período, inicia-se o prazo agrotécnico para a sementeira das culturas cerealíferas de inverno nos campos altos e no Pré-Bálcãs. Até ao final de setembro, as condições permitirão superar os atrasos na sementeira da colza de inverno. O período é adequado para a sementeira de outono de espinafres e para o estabelecimento de novas plantações de morangueiro.

No início do período, em locais isolados nos campos de bacia, não pode ser excluída a possibilidade de formação de geada, o que exige a colheita atempada dos produtos suscetíveis a danos por geada.

Durante a primeira semana de outubro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável, e na segunda metade do período – também por temperaturas abaixo do normal. A precipitação prevista para a primeira semana de outubro atrasará a limpeza das áreas com culturas em linha tardias. O tempo húmido e fresco no meio da primeira década será um pré-requisito para o desenvolvimento de agentes patogénicos que causam podridões – o bolor cinzento na colheita ainda por recolher das variedades tardias de uvas para vinho, e a podridão castanha tardia nos frutos das variedades de árvores de fruto de outono-inverno.

A precipitação ocorrida no final de setembro nas regiões do noroeste, em parte das regiões do nordeste e no campo de Sófia, na faixa de 20–30 l/m² (N. selo, Vidin, Lom, Oryahovo, Sófia, V. Tarnovo, Dobrich), aumentou as reservas de humidade nas camadas superiores do solo. Durante o período seguinte, na Bulgária Ocidental e nas regiões centrais, prevê-se novamente a probabilidade de precipitação local e intensa, o que dificultará a implementação da lavoura pré-semeadura nas áreas destinadas à sementeira com culturas de outono. Esperam-se atrasos significativos na sementeira da colza de inverno. As condições agrometeorológicas adversas no final do verão e início do outono, a seca e a subsequente precipitação intensa, são a razão para que em muitos locais das regiões de campo se tenham perdido os prazos agrotécnicos em setembro para a sementeira da colza – uma cultura que requer uma agronomia precisa. No início de outubro, inicia-se o prazo agrotécnico para a sementeira de trigo no norte da Bulgária.

Fonte: NIMH