

Previsão agrometeorológica para outubro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



Em outubro, as condições agrometeorológicas serão dinâmicas, com temperaturas próximas das normas climáticas e precipitação acima das normas mensais.

Durante os primeiros dias de outubro, são previstas temperaturas mais altas que o habitual para a estação, criando condições para a formação de rendimento adicional das culturas hortícolas tardias, bem como para um aumento do teor de açúcar nos frutos das variedades de outono das árvores frutíferas e das variedades tardias de uvas para vinho.

Após as temperaturas acima do normal, está previsto um arrefecimento de curta duração e uma normalização das condições térmicas durante a segunda metade da primeira década do mês.

Durante a primeira década de outubro, é esperada precipitação significativa, o que irá dificultar ainda mais as atividades agrotécnicas sazonais. Melhores condições para a realização do preparo do solo pré-semeadura e da semeadura das culturas de inverno são esperadas durante a primeira metade da segunda e na maioria dos dias da terceira década.

A seca e a subsequente precipitação significativa, em alguns lugares intensa, no final do verão e início do outono foram a razão para o não cumprimento das datas ótimas de semeadura em setembro para a colza de inverno. Uma parte significativa das áreas planeadas será semeada em outubro, após os prazos agrotécnicos. Devido a estas razões objetivas, existe a probabilidade de que as sebes de colza semeadas tardiamente não consigam formar uma roseta (7–8 folhas) durante a sua vegetação outonal – a fase em que as plantas hibernam com sucesso.

Outubro é o período ótimo para a semeadura das culturas cerealíferas de inverno. Durante a primeira década é o prazo agrotécnico para a semeadura do trigo no Norte da Bulgária, de 15 a 25 de outubro – no Sul da Bulgária, e no final do mês – nas áreas ao longo da costa do Mar Negro.

Durante o mês, as fases iniciais de vegetação das culturas de inverno semeadas irão decorrer a ritmos moderados, tendo em conta a presença de boas reservas de humidade nas camadas superiores do solo. No final de outubro, no trigo, dependendo das datas de semeadura, serão observadas as fases de emergência e da terceira folha. Nas sebes mais precoces, semeadas no final de setembro e início de outubro, também será observado o início da fase de afilhamento. Na colza, predominará a formação foliar.

As condições térmicas previstas para outubro, próximas do normal, são um pré-requisito para o aumento da população do rato-do-campo – uma das pragas perigosas nas culturas de inverno. Até ao final do mês, as sebes de inverno devem ser inspecionadas quanto à presença da praga, e se a sua densidade exceder o limiar económico de dano (2 colónias ativas por decares), são necessárias medidas atempadas de proteção das plantas (iscos envenenados colocados nas entradas das colónias).

No final de outubro, as condições permitirão a implementação de certas atividades fitossanitárias em pomares. Os pomares de macieira e pereira afetados pela sarna, após a colheita, devem ser tratados com uma solução de ureia a 5% para reduzir a infeção. Nas espécies de fruta de caroço, após a queda massiva das folhas, recomenda-se a pulverização com uma calda bordalesa a 2% contra os agentes causadores da cribose, da podridão castanha precoce e da lepra do pessegueiro.

Fonte: NIMH