

A terceira década de outubro – um fator limitante para o desenvolvimento das culturas de outono será a falta de umidade nas camadas superiores do solo.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022*



Durante a primeira metade da terceira década de outubro, as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas pelo tempo seco e temperaturas acima das normas climáticas.

Nos estandes de trigo e cevada semeados no início do mês, ocorrerão as fases de germinação, emergência (estações agrometeorológicas de Novachene e Pavlikeni) e início da formação de folhas, e na colza de inverno – formação de folhas. Em muitas regiões do país, o fator limitante para o desenvolvimento dos estandes das

culturas de outono será a falta de umidade nas camadas superficiais do solo. Durante a segunda metade do período, terão início os prazos agrotécnicos ideais para a semeadura de culturas cerealíferas de inverno ao longo da costa do Mar Negro.

O déficit das reservas de umidade do solo na camada arável dificultará a execução adequada da aração profunda dos restolhos, do preparo pré-semeadura do solo dos campos e da semeadura de trigo e cevada.

O tempo será adequado para inspecionar os estandes de cereais de inverno quanto à ocorrência e atividade nociva de certas pragas – rato-do-campo, crisomelídeo dos cereais, moscas-dos-cereais e pulgões. Atenção especial deve ser dada às áreas onde é aplicado o cultivo em monocultura.

As condições serão favoráveis para a realização de atividades fitossanitárias em culturas permanentes – remoção de ramos secos e frutos mumificados, raspagem de casca velha e rachada, e tratamento de espécies de frutas de pomóideas afetadas por sarna com uma solução de ureia a 5% para limitar a infecção.

Fonte: NIMH