

Previsão agrometeorológica para novembro

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



Durante a primeira quinzena de novembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas pelo tempo seco e temperaturas acima das normas climáticas. Até meados do mês, o fator limitante para o desenvolvimento das culturas de outono semeadas continuará a ser o déficit de humidade do solo. Em partes das regiões sul e sudeste (estação agrometeorológica de Karnobat), a seca resultante colocará em dúvida a sobrevivência de parte das culturas germinadas e emergidas.

No final de outubro, o nível das reservas de humidade do solo na camada de 50 e 100 cm estava anormalmente baixo, em muitos locais do sul da Bulgária – abaixo de 40% da capacidade de campo (estações agrometeorológicas: Plovdiv, Pazardzhik, Sliven). Em partes das regiões sudeste (estação agrometeorológica de Karnobat) não havia humidade em toda a camada de um metro do solo.

No início de novembro, a seca limitará a realização das mobilizações de solo sazonais e, em algumas das áreas de campo, atrasará a sementeira das culturas cerealíferas de inverno para além dos prazos agrotécnicos.

Durante a segunda quinzena de novembro, as condições agrometeorológicas sofrerão uma alteração. Desde o meio da segunda até ao meio da terceira década, estão previstas precipitações, bem como uma melhoria nas reservas de humidade do solo nas camadas superiores e nas condições para o progresso das fases iniciais de vegetação das culturas de outono semeadas. Durante este período, o desenvolvimento das culturas cerealíferas de inverno ocorrerá com temperaturas médias diárias próximas das normas climáticas para a segunda metade do mês.

No final de novembro, o trigo e a cevada estarão nas fases de emergência e formação da 1ª, 2ª e 3ª folha. Para uma pequena parte das culturas em certos locais das regiões da planície do Danúbio (estações agrometeorológicas: Bazovets, Novachene, na região de Ruse), onde a precipitação local no início do outono assegurou humidade para a vegetação inicial das culturas cerealíferas de inverno, também será observada a fase de afilamento.

Não estão previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas de outono emergidas durante o mês. No início de novembro, deve continuar a inspeção das culturas quanto à presença de pragas – mosca-minadora do trigo, moscas-das-cereais – e onde a sua densidade exceder o limiar económico de nocividade (para moscas-das-cereais o LEN é de 3–4 ind./m², para a mosca-minadora do trigo – mais de 3 larvas/m²), deve ser realizado um tratamento atempado.

Condições favoráveis para a realização de pulverizações de proteção fitossanitária de outono em pomares para limitar infeções de sarna, podridão parda precoce, mancha bacteriana, enrolamento das folhas do pessegueiro e outros patógenos de hibernação ocorrerão durante a primeira quinzena de novembro, e para a plantação de árvores de fruto – durante a terceira década.

Fonte: NIMH