

Dezembro – preste atenção às atividades fitossanitárias nas culturas perenes

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022*



Na maioria dos dias de dezembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo dinâmico, com alternância de curtos períodos de temperaturas médias diárias em torno, abaixo e acima das normas climáticas.

No início do mês, o teor de umidade aumentado nas camadas superiores do solo limitará a implementação do preparo sazonal do solo. No meio do período, não se espera precipitação, o que proporcionará uma oportunidade para a realização de atividades fitossanitárias nas culturas permanentes.

O resfriamento ocorrido no final de novembro levou a uma desaceleração e, nos campos mais altos e no Pré-Balcãs, onde se formou uma cobertura de neve, a uma cessação dos processos vegetativos nas culturas de outono-semeadas.

No início de dezembro, prevê-se um aumento nas temperaturas, mas seus valores médios diários, com exceção de algumas localidades no sul da Bulgária e ao longo da costa do Mar Negro, não excederão o mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno.

Durante o mês, na maior parte do país, as culturas de outono-semeadas permanecerão em um estado de dormência relativa. Exceções serão mais uma vez observadas nas culturas das regiões sul e sudeste no final da primeira e durante a primeira metade da segunda década do mês. Durante esse tempo, são previstas temperaturas acima do normal, com valores máximos acima de 10–12°C e condições para vegetação retardada nas culturas de cereais de inverno, mas é improvável uma mudança no estado fenológico das culturas.

Este ano, uma parte significativa das lavouras de trigo passará o inverno em um estágio inicial de seu desenvolvimento. A seca durante a primeira metade do outono na maior parte do país restringiu e atrasou a vegetação das culturas de cereais de inverno. Por esta razão objetiva, as culturas entrarão no inverno em diferentes fases fenológicas: emergência, 1–2–3 folhas e início do perfilhamento. Apenas uma pequena parte das lavouras de trigo em certas localidades da Planície do Danúbio – na estação agrometeorológica de Novachene e na região de Ruse – está na fase de perfilhamento, na qual as culturas suportam melhor as condições de inverno.

Em dezembro, as temperaturas mínimas previstas, de até menos 9–10°C, em condições sem cobertura de neve e com persistência mais prolongada, representarão um risco para as culturas de cereais de inverno que emergiram, mas ainda não se endureceram.

A precipitação esperada durante o mês, em torno e acima da norma, aumentará o nível das reservas de umidade na camada de solo de 50 e 100 cm. Após a precipitação generalizada na segunda metade de novembro, que em muitas partes do país excedeu 40–50 l/m², o déficit de umidade nas culturas de outono-semeadas foi superado.