

Fevereiro – restaura a dormência nas culturas de outono e interrompe o desenvolvimento de algumas espécies de frutas de caroço

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.02.2023 Брой: 2/2023



O período de frio no final de janeiro, após as temperaturas anormalmente altas para a estação, restaurou a dormência nas culturas de outono e impediu o desenvolvimento prematuro em algumas espécies de frutas de caroço.

Em fevereiro, as condições agrometeorológicas serão cada vez mais dinâmicas. Durante a maioria dos dias da primeira década, serão determinadas por temperaturas abaixo do normal, mas sem valores mínimos críticos para as culturas agrícolas em hibernação. Na maior parte do país, com exceção das regiões sudeste e do litoral

do Mar Negro, são previstas quedas de neve, formação de cobertura de neve e uma melhoria nas condições de hibernação das culturas de outono.

No início da segunda década, é esperado um aquecimento e uma mudança nas condições agrometeorológicas. As temperaturas previstas até o final de fevereiro, na maioria das áreas de campo, estarão próximas das normas climáticas e manterão as culturas de cereais de inverno em dormência. Exceções são novamente esperadas nas regiões sul e ao longo do litoral do Mar Negro. Nessas regiões, durante a segunda década, prevê-se que os valores médios diários fiquem em torno e acima do mínimo biológico necessário para a retomada dos processos vegetativos nas culturas de outono. No final de fevereiro, as lavouras de trigo estarão nos estágios de crescimento de terceira folha e perfilhamento.

Durante o mês, as temperaturas mínimas previstas, na faixa de menos 12-13°C, estão acima dos limites críticos para as culturas de cereais de inverno que entraram na fase de perfilhamento. Esses valores, em condições sem cobertura de neve, representarão um risco para as lavouras em hibernação no estágio de terceira folha (estações agrometeorológicas: Kneja, Targovishte, Kyustendil, Pazardzhik, Chirpan, Sliven, Yambol, Dolni Chiflik).

A precipitação esperada em fevereiro, em torno e acima das normas climáticas, aumentará as reservas de umidade do solo nas camadas de um e dois metros. A precipitação significativa durante a segunda e terceira décadas de janeiro, em muitos lugares do país acima de 60-70 l/m², e em algumas regiões sul – acima de 120-130 l/m² (Haskovo-165 l/m², Kardzhali-214 l/m², Chirpan-133 l/m², Stara Zagora-144 l/m²), aumentou acentuadamente o nível das reservas de umidade nas culturas de cereais de inverno. Na maioria das áreas de campo, a reserva total de água nas culturas de outono na camada de solo de um metro atingiu níveis acima de 90% da CC (capacidade de campo).

Em fevereiro, condições mais adequadas para a poda em vinhedos e pomares, e para a realização de pulverizações de proteção de plantas de inverno em pomares, ocorrerão durante a segunda década. A precipitação frequente durante o mês manterá as camadas superiores do solo encharcadas, o que dificultará a adubação de cobertura das culturas de outono com fertilizantes minerais nitrogenados e a implementação do preparo do solo pré-semeadura em áreas destinadas ao plantio com culturas de primavera precoce (ervilhas, ervilhaca, aveia, cevada de primavera).