

Previsão agrometeorológica para março

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



As anomalias climáticas durante a segunda quinzena de fevereiro, com temperaturas máximas anormalmente altas para a estação, ultrapassando 21-22°C em muitas das áreas de planície (Knezha - 24°C, Lovech - 23°C, Pleven - 23°C, Plovdiv - 23°C, Chirpan - 23°C), levaram à ativação dos processos de vegetação nas culturas de outono e ao desenvolvimento prematuro das árvores frutíferas.

Durante o primeiro decêndio de março, apenas em alguns locais do sul da Bulgária – Plovdiv, Pazardzhik, Sandanski, Kardzhali e Haskovo, foram registradas precipitações economicamente significativas entre 20-30 l/m², o que levou a uma melhoria nas reservas de humidade do solo nas culturas de outono.

Nas regiões central e oriental, as temperaturas estiveram acima das normas climáticas e acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno.

Durante a maioria dos dias do segundo decêndio, nas regiões de planície do país, são previstas temperaturas próximas do habitual para o período, bem como condições para vegetação atrasada nas culturas de cereais de inverno.

É esperado um aumento das temperaturas e ativação dos processos de vegetação nas culturas de outono e plantações perenes durante a primeira metade do terceiro decêndio. No final de março, a fase de afilhamento predominará no trigo e na cevada.

Durante o mês, as culturas frutíferas passarão por várias fases - desde o inchaço e rebentação das gemas frutíferas até ao cacho verde, floração e vingamento dos frutos nas espécies de frutos de caroço de floração precoce (amendoeira, damasqueiro, pessegueiro).

Em março, são previstas temperaturas mínimas na faixa de menos 5-10°C - valores críticos para as flores e os jovens frutos das árvores frutíferas.

A precipitação esperada durante o mês, em torno e acima da norma, aumentará as reservas de humidade do solo na camada de 100 cm. Como resultado da precipitação abaixo do normal em fevereiro, o nível das reservas de humidade do solo nas camadas de 50 e 100 cm nas culturas de cereais de inverno nas regiões extremo sul e sudeste estava anormalmente baixo para a estação - em alguns locais abaixo de 55% da capacidade de campo (estações agrometeorológicas de Sliven, Chirpan).

Em março, a previsão de tempo dinâmico, com precipitação frequente, dificultará a implementação das atividades agrotécnicas sazonais. Condições mais favoráveis para a realização de pulverizações de proteção fitossanitária pré-floração em árvores frutíferas ocorrerão durante a segunda metade do primeiro decêndio. Durante o mês, o aumento do teor de humidade nas camadas superiores do solo limitará a implementação da preparação do solo pré-semeadura nas áreas destinadas à sementeira com culturas de primavera precoces e médias-precoces. Por esta razão, existe a probabilidade de perder as datas ótimas de sementeira para o girassol nas regiões sul.

Em meados de março começa o período agrotécnico (15-20.03) para a sementeira de girassol no sul da Bulgária, e no meio do terceiro decêndio (25.03–5.04) – na Planície do Danúbio.

Onde e quando nas diferentes regiões do país haverá condições para realizar atividades de proteção fitossanitária, consulte [AQUI](#)

Fonte NIMH