

Condições agrometeorológicas instáveis e dinâmicas no final de março

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.03.2023 Брой: 3/2023*



No final de março, as condições agrometeorológicas serão caracterizadas por uma dinâmica acentuada. Na primeira metade do período, são previstas temperaturas acima do normal e a ativação dos processos de vegetação nas culturas de outono-inverno e nas plantações perenes. No trigo, a fase de afilamento ocorrerá em grande escala. Em locais da Planície do Danúbio e nas regiões do sul, também será observado o início da fase de alongamento do colmo nas culturas de cereais de inverno (estações agrometeorológicas de Novachene, Silistra, Haskovo).

No final do mês, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança substancial. Durante os últimos dias de março, elas serão determinadas por temperaturas abaixo das normas climáticas, próximas do mínimo

biológico necessário para a vegetação das culturas de outono-inverno e das culturas de primavera já semeadas. Nas regiões nordestinas e nos campos elevados, há uma probabilidade prevista de precipitação, incluindo neve, e um risco de danos para as espécies de frutas de caroço que entraram na fase de floração.

A precipitação esperada durante a última semana de março melhorará as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm. No final da segunda década de março, em partes das regiões sul e leste, o nível das reservas de humidade do solo nas culturas de cereais de inverno, nas camadas de 50 e 100 cm, era baixo para o início do período de vegetação da primavera, em alguns locais abaixo de 65% da capacidade de campo (CC). Reservas relativamente boas, acima de 85% da CC, foram registradas nas culturas de outono-inverno nas regiões noroeste do país (estações agrometeorológicas: Bazovets, Nikolaevo, Novachene, Borima).

Durante a maioria dos dias do próximo período, a previsão de tempo instável com precipitação frequente dificultará a realização de pulverizações de proteção fitossanitária em pomares, o preparo do solo pré-semeadura e a sementeira das culturas de primavera de ciclo médio a precoce.

Em meados da terceira década de março (25.03–05.04), inicia-se o período agrotécnico para a sementeira do girassol na Planície do Danúbio.

Fonte: NIMH