

Durante o terceiro decêndio de abril, as condições serão favoráveis para um aumento do fundo infeccioso de uma série de doenças fúngicas.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023*



Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo variável com precipitações frequentes, o que manterá um nível muito bom de reservas de humidade do solo na camada de 50 cm e boas condições para a vegetação das culturas outonais e das recém-semeadas culturas de primavera. A precipitação significativa que caiu durante a primeira e a segunda décadas de abril na maior parte do país excedeu as normas mensais (Vidin - 61 l/m², Vratsa - 84 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Razgrad - 103 l/m², Silistra - 77 l/m², Shumen - 86 l/m², Dobrich - 80 l/m², Haskovo - 77 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Elhovo - 91

l/m², Stara Zagora - 77 l/m², Karnobat - 68 l/m²) e melhorou as reservas de humidade nas camadas mais profundas do solo. No final da segunda década, na maioria das áreas de campo, as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm para as culturas de cereais de inverno atingiram níveis superiores a 80–85% da capacidade de campo.

Na maioria dos dias do próximo período, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo moderado, com temperaturas próximas e, no final do período, ligeiramente abaixo das normas climáticas. Durante o período, o trigo estará predominantemente na fase de alongamento do colmo, e na cevada, em alguns locais da Planície do Danúbio (estação agrometeorológica de Novachene), também se observará o início do espigamento. A colza de inverno estará predominantemente na fase de floração. Nas culturas de girassol e milho, dependendo das datas de sementeira, serão observadas a emergência e a formação de folhas.

No Centro-Norte e Noroeste da Bulgária, novamente devido às chuvas prolongadas e condições climáticas desfavoráveis, a sementeira está a ser atrasada. Os produtores asseguram as sementes necessárias, as áreas foram preparadas e, sob condições favoráveis, os agricultores estão prontos para semear à primeira oportunidade. As áreas semeadas até agora são muito pequenas em comparação com o mesmo período em anos anteriores.

As frequentes precipitações previstas para a terceira década de abril criarão condições para um aumento da pressão de infeção de várias doenças fúngicas: septoriose e ferrugem das folhas nos cereais de inverno; nas árvores de fruto – murchidão das flores (podridão castanha precoce), mancha das folhas, enrolamento das folhas do pessegueiro, sarna, o que exige, à primeira oportunidade após a cessação da precipitação, a aplicação atempada de medidas de proteção das plantas.

Fonte: NIMH