

No início de maio – condições para formação de geada nos campos altos e baixos

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.05.2023 *Брой:* 5/2023



A precipitação generalizada que ocorreu durante a segunda metade de abril manteve bons níveis de reservas de humidade do solo para as culturas agrícolas na camada de 50 cm, entre 80–90% da capacidade de campo (CC).

Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas por tempo instável. Os processos de vegetação nas culturas agrícolas prosseguirão a um ritmo moderado sob temperaturas médias diárias próximas e abaixo das normas climáticas para o final de abril e início de maio. O trigo de inverno estará predominantemente na fase de crescimento de alongamento do colmo. A colza continuará na sua fase de floração. No milho e no girassol, serão observadas a emergência e o início da

formação das folhas. Nas espécies frutíferas, ocorrerão a floração, a foliação e a formação do vingamento dos frutos. Na videira, será observado o desenvolvimento de 1 a 3 folhas.

O tempo instável durante o período, com chuviscos frequentes, dificultará a realização da preparação do solo pré-semeadura e da sementeira das culturas de primavera tardias, bem como a implementação de pulverizações de proteção das plantas. Após a cessação da precipitação, são recomendados tratamentos preventivos contra o míldio e a excoriose na videira, a sarna nas pomóideas, a murchidão das flores (podridão castanha precoce) e a cribadura nas fruteiras de caroço, e contra a lepra do pessegueiro.

No início do período, nos campos e bacias mais elevados, ocorrerão condições para a formação de geada no solo e para danos nas culturas agrícolas.

Fonte: NIMH