

# Precipitação frequente e tempo instável durante a segunda quinzena de maio

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



Durante o próximo período, as condições agrometeorológicas serão novamente determinadas por tempo instável, com precipitações frequentes, o que manterá boas reservas de humidade na camada de solo de 50 e 100 cm.

Na maior parte do país, com exceção de algumas localidades nas regiões orientais (Chirpan, D. Chiflik, Karnobat), as reservas de humidade do solo na camada de um metro para as culturas de outono estão acima de 80% da capacidade de campo (CC).

Durante o período, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo moderado, com temperaturas médias diárias próximas das normas climáticas para a segunda metade de maio. Até meados da terceira década, nas áreas de campo, as culturas de cereais de inverno estarão em fase de formação e enchimento do grão. No final do período, em algumas localidades das regiões do sul (Sandanski, Karnobat), também será observado o início da fase de maturação leitosa na cevada.

No girassol e no milho, estará em curso a formação das folhas.

Na videira, predominará a fase de emergência da inflorescência. Esta fenofase é crítica para a infecção das videiras pelo míldio (*Plasmopara viticola*) e pelo oídio (*Uncinula necator*).

A precipitação prevista durante o período manterá condições favoráveis para o desenvolvimento de doenças fúngicas: ferrugens, mancha foliar por septoria e fusariose da espiga no trigo; míldios em culturas hortícolas e videira; podridão castanha tardia nos frutos das cultivares precoces de cerejeira.

No final de maio, os danos nas cultivares de cerejeira de média precocidade são causados pela mosca-da-cereja. Para reduzir os danos desta praga perigosa, recomenda-se que, no início da fase de maturação, à primeira oportunidade após a cessação da precipitação, seja realizado um tratamento com inseticidas com um curto intervalo de pré-colheita.

*Fonte: NIMH*