

No pomar em julho

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 *Брой:* 7/2023



Em julho, em **pomares de macieira** onde não ocorreu infecção por sarna, a pulverização contra esta doença é interrompida. Na presença de infecção em folhas e frutos e com chuvas frequentes, o risco de infecções tardias e um aumento no grau de danos aos frutos persiste, o que neste caso torna necessário realizar tratamentos mesmo durante este período.

Para cultivares de macieira suscetíveis ao oídio, a pulverização contra esta doença também continua. Para o controle simultâneo de ambas as doenças, utiliza-se um dos seguintes fungicidas: Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da e Kumulus – 600–900 g/da contra o oídio, e Chorus 50 WG – 0,03%, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da e Captan 80 WG – 150–180 g/da contra a sarna. Para o controle

simultâneo de ambas as doenças, são adequados os seguintes: Flint Max 75 WG – 0,02%, Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Para prevenir o surgimento de resistência do fungo causador da sarna (*Venturia inaequalis*), é melhor alternar produtos com diferentes modos de ação sobre o patógeno ou usar misturas de fungicidas para seu controle.

Cultivares resistentes à sarna – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, etc., são pulverizadas apenas contra o oídio.

Para a **pereira**, a pulverização contra a sarna e as manchas foliares brancas e marrons deve ser continuada.

Para o controle dessas doenças, utiliza-se um dos seguintes fungicidas: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Para a **ameixeira** em julho, a pulverização é direcionada contra a podridão parda e a ferrugem. Contra a podridão parda, a pulverização é realizada com um dos seguintes fungicidas: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0,045%, Geoxe – 40–60 g/da. Contra a ferrugem, é aprovado o Signum WG – 45 g/da, que também é eficaz contra a podridão parda.

No início de julho, os frutos das cultivares precoces de pessegueiro começam a amadurecer e durante este período não são pulverizados. Para **cultivares tardias de pessegueiro**, continua o controle do oídio, da cribose e da podridão parda. Contra o oídio, utiliza-se um dos seguintes fungicidas: Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0,03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Para o controle da podridão parda, a pulverização é realizada com Delan 700 WDG – 0,05%, Chorus 50 WG – 0,045% ou Luna Experience – 63–75 ml/da.



Em julho, os damascos amadurecem e não são pulverizados.

Para a **framboeseira**, durante este período não é realizada pulverização, com exceção das **cultivares remanescentes** como Lyulin. Para elas, são necessários tratamentos contra a didimela e a antracnose. Utiliza-se um dos seguintes fungicidas: Signum WG – 100 g/da e Funguran OH 50 WP – 0,15%. Com chuvas frequentes e alta umidade do ar, também é necessária pulverização contra o mofo cinzento. Utiliza-se Switch 62.5 – 100 g/da.

Após a colheita, as folhas das **plantações de morango** são roçadas, removidas da plantação e destruídas por queima ou enterradas para que se decomponham.